

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICED35

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	0.8	0.239-1.433	0.8	0.239-1.433
Baja California	0.5	0.079-0.821	0.5	0.079-0.821
Baja California Sur	0.4	---	0.4	---
Campeche	0.6	0.002-1.266	0.3	---
Chiapas	---	---	--	---
Chihuahua	1.8	0.436-3.120	1.5	0.191-2.789
Ciudad de México	0.6	---	0.4	---
Coahuila	0.2	---	0.1	---
Colima	0.8	---	0.6	---
Durango	0.1	---	0.1	---
Estado de México	--	---	--	---
Guanajuato	0.2	---	0.2	---
Guerrero	0.3	---	0.2	---
Hidalgo	0.1	---	0.1	---
Jalisco	1.1	0.152-2.125	1.0	0.052-2.007
Michoacán	0.7	0.135-1.331	0.7	0.109-1.255
Morelos	0.1	---	0.1	---
Nayarit	0.6	0.096-1.141	0.6	0.067-1.106
Nuevo León	1.0	0.073-2.010	1.0	0.029-1.962
Oaxaca	0.1	---	0.1	---
Puebla	0.4	---	0.3	---
Querétaro	0.7	0.212-1.239	0.7	0.183-1.204
Quintana Roo	0.9	0.315-1.426	0.6	0.144-1.115
San Luis Potosí	0.6	0.012-1.226	0.6	0.012-1.226
Sinaloa	0.3	---	0.2	---
Sonora	0.6	---	0.5	---
Tabasco	0.4	---	0.1	---
Tamaulipas	0.7	0.061-1.255	0.6	0.018-1.088
Tlaxcala	0.1	---	0.1	---
Veracruz	0.2	---	***	---
Yucatán	0.4	---	0.3	---
Zacatecas	0.6	0.161-1.029	0.6	0.161-1.029
Nacional	0.5	0.339-0.574	0.4	0.265-0.487

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED36

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.4	0.723-1.997	0.3	---
Baja California	2.4	1.397-3.477	0.3	---
Baja California Sur	1.5	0.772-2.237	0.2	---
Campeche	0.6	0.166-1.030	0.3	---
Chiapas	0.1	---	***	---
Chihuahua	2.0	1.047-2.901	0.8	0.167-1.473
Ciudad de México	1.4	0.616-2.186	0.4	---
Coahuila	2.3	1.127-3.423	0.4	0.102-0.788
Colima	1.3	0.563-2.041	0.2	---
Durango	1.3	0.665-1.976	0.6	0.175-0.977
Estado de México	1.1	0.361-1.873	0.3	---
Guanajuato	1.0	0.490-1.512	0.2	---
Guerrero	0.6	0.178-1.022	0.4	---
Hidalgo	0.4	0.045-0.726	0.1	---
Jalisco	1.3	0.579-2.067	1.5	---
Michoacán	2.1	1.213-3.035	0.3	---
Morelos	0.8	0.303-1.390	0.1	---
Nayarit	2.0	0.610-3.448	0.2	---
Nuevo León	1.5	0.716-2.293	0.6	0.002-1.236
Oaxaca	0.5	0.104-0.855	0.1	---
Puebla	0.7	0.101-1.310	0.4	---
Querétaro	1.4	0.732-2.135	0.5	0.052-0.975
Quintana Roo	1.7	0.916-2.538	0.7	0.195-1.160
San Luis Potosí	0.6	0.199-0.915	0.1	---
Sinaloa	1.5	0.746-2.241	0.3	0.014-0.501
Sonora	2.0	1.193-2.888	0.4	0.048-0.821
Tabasco	0.8	0.331-1.290	0.5	0.170-0.907
Tamaulipas	0.7	0.226-1.262	0.3	0.036-0.629
Tlaxcala	1.0	0.283-1.694	0.1	---
Veracruz	0.5	0.081-0.898	0.3	0.001-0.502
Yucatán	1.2	0.520-1.972	0.4	---
Zacatecas	1.2	0.448-1.863	0.4	---
Nacional	1.2	1.000-1.331	0.4	0.267-0.552

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 6: CUADROS DE TRATAMIENTO DE DROGAS



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE DROGAS**

Listado de Tablas

Tipo de tratamiento de los usuarios de drogas de 12 a 65 años según sexo (1)

Tipo de tratamiento de los usuarios de drogas de 12 a 65 años según sexo (2)

Población de 12 a 65 años que acudió a consultar algún profesional de la salud por su consumo de drogas según sexo

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población de 12 a 65 años según sexo

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO**

Tipo de tratamiento de los usuarios de drogas de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CTD1

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	319 058		57 680		376 738	
	N	%	N	%	N	%
Tratamiento de desintoxicación	123 909	38.8	23 630	41.4	147 538	39.2
Tratamiento residencial	100 704	31.6	17 554	30.4	118 258	31.4
Tratamiento ambulatorio	58 004	18.2	12 987	22.5	70 992	18.8
Tratamiento por internet	31 089	9.7	807	1.4	31 896	8.5
Tratamiento en una clínica de metadona	21 629	6.8	7 109	12.3	28 739	7.6
Tratamiento en un anexo	138 976	43.6	21 391	37.1	160 367	42.6

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento por su uso de drogas según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO

Tipo de tratamiento de los usuarios de drogas de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CTD2

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	556 647		146 852		703 499	
	N	%	N	%	N	%
Completo con profesionalista	127 107	23.5	35 476	24.8	162 583	23.8
Parcial con profesionalista	292 545	54.1	88 888	62.1	381 433	55.8
Autoayuda	113 153	20.9	18 454	12.9	131 608	19.3
Otro tipo	7 572	1.4	403	0.3	7 975	1.2

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento por su uso de drogas según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO**

**Población de 12 a 65 años que acudió a consultar algún profesional de la salud
por su consumo de drogas según sexo**

Cuadro CTD3

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	556 647		146 852		703 499	
Profesional al que acudió:	N	%	N	%	N	%
Psiquiatra	203 536	36.6	50 450	34.4	253 986	36.1
Médico familiar o general	167 223	30.0	38 577	26.3	205 800	29.3
Otro médico especialista	75 757	13.6	35 335	24.1	111 093	15.8
Psicólogo	297 935	53.5	110 342	75.1	408 278	58.0
Trabajadora Social	177 163	31.8	24 635	16.8	201 798	28.7
Enfermera u otro/a profesional de la salud en un Centro de Salud	140 243	25.2	19 721	13.4	159 964	22.7
Psicoterapeuta u otro/a profesional de la salud de forma independiente	85 286	15.3	8 912	6.1	94 197	13.4
Consejero espiritual	194 253	34.9	35 219	24.0	229 473	32.6
Grupo de autoayuda	327 516	58.8	53 853	36.7	381 369	54.2
Un curandero/ yerbero	81 088	14.6	3 001	2.0	84 089	12.0
Consultó a algún otro especialista	33 517	6.0	--	--	33 517	4.8

Porcentajes obtenidos de los usuarios de drogas para cada tipo de profesional según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO**

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CTD4

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	6 170 259		2 001 112		8 171 371	
	N	%	N	%	N	%
Usted no consultó a un profesional por su uso de drogas porque:						
Pensó que no tenía un problema	1 657 198	27.6	529 058	27.0	2 186 256	27.4
Pensó que podría resolverlo solo	1 661 614	27.4	343 966	17.5	2 005 580	25.0
Creyó que el tratamiento no le ayudaría	657 523	10.9	124 130	6.4	781 653	9.8
No sabe a dónde acudir	785 885	13.0	147 792	7.6	933 677	11.7
No acudió por vergüenza	539 594	8.8	123 227	6.2	662 822	8.2
Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia	542 965	9.4	111 455	5.9	654 419	8.5
No cuenta con suficientes recursos económicos	647 114	10.8	120 210	6.2	767 324	9.6
Su seguro médico no cubre este tratamiento	379 917	6.5	80 694	4.3	460 610	6.0
El problema se acabó solo	1 452 548	24.4	582 627	29.9	2 035 175	25.8
Pensó que el problema mejoraría solo	1 538 263	25.4	476 157	24.6	2 014 420	25.2
Le preocupa lo que la gente piense de usted	429 654	7.0	132 807	6.8	562 460	7.0
Pensó que le tomaría mucho tiempo	584 434	9.7	119 241	6.1	703 675	8.8
No podía conseguir una cita	261 509	4.4	42 018	2.2	303 526	3.8
No deseaba ser internado en contra de su voluntad	693 321	11.4	163 709	8.3	857 030	10.6
No estaba satisfecho con los servicios disponibles	499 528	8.4	88 364	4.6	587 893	7.5
Había recibido tratamiento antes y no había funcionado	185 339	3.1	28 983	1.5	214 322	2.7
El problema no le molesta mucho	491 304	8.1	131 760	6.8	623 064	7.8
Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán	277 705	4.6	66 767	3.5	344 472	4.3
Cualquier otra	215 876	3.6	38 641	2.0	254 517	3.2

Porcentajes obtenidos de la población que no ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas, según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO**

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro CTD5

N por subgrupo	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%
	3 696 738		1 893 080		2 581 553	
Usted no consultó a un profesional por su uso de drogas porque:						
Pensó que no tenía un problema	965 324	26.8	538 349	29.2	682 583	26.9
Pensó que podría resolverlo solo	864 025	23.9	415 297	22.2	726 257	28.6
Creyó que el tratamiento no le ayudaría	301 846	8.4	203 727	11.0	276 079	11.0
No sabe a dónde acudir	416 372	11.6	197 739	10.6	319 566	12.6
No acudió por vergüenza	275 876	7.6	153 554	8.2	233 392	9.1
Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia	319 015	9.2	155 114	8.7	180 291	7.4
No cuenta con suficientes recursos económicos	320 326	9.0	195 078	10.5	251 920	9.9
Su seguro médico no cubre este tratamiento	228 654	6.6	88 977	5.0	142 980	5.8
El problema se acabó solo	1 022 706	29.1	409 008	22.2	603 460	23.7
Pensó que el problema mejoraría solo	983 730	27.3	387 595	20.9	643 095	25.4
Le preocupa lo que la gente piense de usted	257 938	7.1	138 732	7.4	165 790	6.5
Pensó que le tomaría mucho tiempo	326 059	9.0	173 593	9.4	204 023	8.1
No podía conseguir una cita	147 747	4.1	79 140	4.3	76 639	3.1
No deseaba ser internado en contra de su voluntad	437 687	12.0	192 168	10.3	227 175	8.9
No estaba satisfecho con los servicios disponibles	240 231	6.8	135 913	7.5	211 749	8.5
Había recibido tratamiento antes y no había funcionado	78 618	2.2	69 586	3.7	66 118	2.6
El problema no le molesta mucho	313 885	8.7	121 012	6.5	188 166	7.4
Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán	161 562	4.5	80 173	4.4	102 737	4.1
Cualquier otra	89 928	2.5	50 124	2.7	114 466	4.6

Porcentajes obtenidos de la población que no ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO**

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro CTD6

N por subgrupo	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%
Usted no consultó a un profesional por su uso de drogas porque:						
Pensó que no tenía un problema	647 939	27.4	421 883	29.1	587 376	26.7
Pensó que podría resolverlo solo	671 265	28.2	354 162	24.1	636 188	28.8
Creyó que el tratamiento no le ayudaría	226 242	9.5	175 975	12.1	255 306	11.6
No sabe a dónde acudir	330 877	14.0	177 820	12.1	277 188	12.5
No acudió por vergüenza	190 780	8.0	143 492	9.7	205 322	9.2
Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia	246 864	10.8	138 482	9.9	157 619	7.4
No cuenta con suficientes recursos económicos	256 211	10.9	177 056	12.2	213 847	9.6
Su seguro médico no cubre este tratamiento	177 686	7.9	85 304	6.1	116 926	5.4
El problema se acabó solo	621 668	27.3	318 309	21.9	512 571	23.1
Pensó que el problema mejoraría solo	668 497	28.1	309 788	21.3	559 978	25.3
Le preocupa lo que la gente piense de usted	164 591	6.9	129 663	8.8	135 400	6.1
Pensó que le tomaría mucho tiempo	232 976	9.8	166 454	11.4	185 005	8.4
No podía conseguir una cita	120 096	5.1	75 629	5.3	65 784	3.0
No deseaba ser internado en contra de su voluntad	318 762	13.3	172 235	11.8	202 324	9.0
No estaba satisfecho con los servicios disponibles	182 527	7.9	125 456	8.7	191 545	8.8
Había recibido tratamiento antes y no había funcionado	65 131	2.7	69 586	4.7	50 623	2.3
El problema no le molesta mucho	234 707	9.9	100 954	6.9	155 643	7.0
Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán	113 282	4.8	71 575	4.9	92 849	4.3
Cualquier otra	63 919	2.7	45 381	3.1	106 577	4.9

Porcentajes obtenidos de la población masculina que no ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO**

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro CTD7

N por subgrupo	12-25 años 1 260 085		26-34 años 404 422		35-65 años 336 605	
	N	%	N	%	N	%
Usted no consultó a un profesional por su uso de drogas porque:						
Pensó que no tenía un problema	317 386	25.7	116 465	29.4	95 207	28.6
Pensó que podría resolverlo solo	192 761	15.7	61 136	15.3	90 069	27.1
Creyó que el tratamiento no le ayudaría	75 604	6.2	27 752	7.1	20 773	6.4
No sabe a dónde acudir	85 494	7.0	19 919	5.1	42 378	13.0
No acudió por vergüenza	85 095	6.8	10 062	2.5	28 070	8.4
Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia	72 151	6.0	16 632	4.2	22 672	7.6
No cuenta con suficientes recursos económicos	64 116	5.2	18 021	4.5	38 073	11.8
Su seguro médico no cubre este tratamiento	50 968	4.3	3 673	0.9	26 053	8.5
El problema se acabó solo	401 039	32.4	90 699	23.4	90 889	28.4
Pensó que el problema mejoraría solo	315 233	25.8	77 807	19.5	83 118	26.6
Le preocupa lo que la gente piense de usted	93 347	7.5	9 069	2.3	30 390	9.5
Pensó que le tomaría mucho tiempo	93 083	7.5	7 139	1.8	19 019	6.0
No podía conseguir una cita	27 651	2.2	3 512	0.9	10 855	3.5
No deseaba ser internado en contra de su voluntad	118 926	9.6	19 934	4.9	24 850	7.7
No estaba satisfecho con los servicios disponibles	57 704	4.7	10 456	2.7	20 203	6.4
Había recibido tratamiento antes y no había funcionado	13 487	1.1	--	--	15 496	4.8
El problema no le molesta mucho	79 179	6.5	20 058	5.0	32 523	10.2
Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán	48 281	4.0	8 598	2.2	9 888	3.1
Cualquier otra	26 008	2.1	4 743	1.2	7 890	2.5

Porcentajes obtenidos de la población femenina que no ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 7: TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Listado de Tablas

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo y edad (1)
Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo y edad (2)
Conducta antisocial y delincuencia en la población de 12 a 65 años según sexo
Conducta antisocial y delincuencia en la población de 12 a 65 años según edad
Conducta antisocial y delincuencia en la población masculina de 12 a 65 años según edad
Conducta antisocial y delincuencia en la población femenina de 12 a 65 años según edad
Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo
Percepción de la población sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según edad
Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo
Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según edad

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo y edad

Cuadro TI1

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales			
	2011		2016	
	N	%	N	%
Hombres				
12-17	4 364 306	64.1	4 591 123	63.3
18-34	5 979 126	39.0	7 514 596	45.7
35-65	5 372 598	32.8	6 315 595	36.1
Subtotal	15 716 030	40.8	18 421 314	44.7
Mujeres				
12-17	4 667 989	70.4	5 054 925	71.3
18-34	7 538 271	46.0	8 911 656	50.7
35-65	6 588 652	36.4	7 799 269	40.2
Subtotal	18 794 912	45.7	21 765 849	49.4
Nacional	34 510 942	43.3	40 187 163	47.1

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo y edad

Cuadro TI2

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales			
	2011		2016	
	N	%	N	%
Hombres				
12-25	8 158 484	54.5	9 201 770	56.8
26-34	2 184 948	30.6	2 903 949	38.8
35-65	5 372 598	32.8	6 315 595	36.1
Subtotal	15 716 030	40.8	18 421 314	44.7
Mujeres				
12-25	8 769 328	59.4	9 866 982	63.0
26-34	3 436 933	41.7	4 099 598	45.5
35-65	6 588 652	36.4	7 799 269	40.2
Subtotal	18 794 912	45.7	21 765 849	49.4
Nacional	34 510 942	43.3	40 187 163	47.1

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Conducta antisocial y delincuencia en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro TI3

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	760 892	2.0	405 673	1.0	1 166 565	1.5	768 877	1.9	293 997	0.7	1 062 874	1.2
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja etc.	363 945	0.9	153 652	0.4	517 597	0.7	463 151	1.1	233 641	0.5	696 792	0.8
Vendido drogas	132 092	0.3	11 887	***	143 979	0.2	197 205	0.5	30 002	0.1	227 207	0.3
Tomado parte en riñas o peleas	2 243 135	5.8	737 812	1.8	2 980 947	3.7	2 632 464	6.4	740 825	1.7	3 373 289	4.0
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	135 942	0.4	20 094	***	156 036	0.2	136 940	0.3	15 284	***	152 223	0.2

Porcentajes obtenidos según sexo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Conducta antisocial y delincuencia en la población de 12 a 65 años según edad

Cuadro TI4

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	558 571	4.2	449 458	1.4	158 535	0.5	442 126	3.1	419 555	1.2	201 193	0.5
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja etc.	147 463	1.1	291 896	0.9	78 238	0.2	157 944	1.1	288 640	0.8	250 208	0.7
Vendido drogas	17 176	0.1	118 825	0.4	7 978	***	43 362	0.3	120 387	0.4	63 458	0.2
Tomado parte en riñas o peleas	1 176 200	8.8	1 415 007	4.5	389 741	1.1	816 449	5.7	1 568 910	4.6	987 931	2.7
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	67 222	0.5	77 493	0.2	11 322	***	17 193	0.1	71 291	0.2	63 739	0.2

Porcentajes obtenidos según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Conducta antisocial y delincuencia en la población masculina de 12 a 65 años según edad

Cuadro TI5

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
En los últimos 12 meses usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	343 717	5.1	320 187	2.1	96 988	0.6	305 830	4.2	314 929	1.9	148 118	0.8
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja etc.	88 649	1.3	244 894	1.6	30 401	0.2	77 936	1.1	190 325	1.2	194 889	1.1
Vendido drogas	14 829	0.2	112 886	0.7	4 377	***	32 566	0.4	110 836	0.7	53 804	0.3
Tomado parte en riñas o peleas	841 180	12.4	1 115 351	7.3	286 604	1.8	550 581	7.6	1 287 088	7.8	794 795	4.5
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	57 627	0.8	76 744	0.5	1 571	***	15 520	0.2	63 548	0.4	57 872	0.3

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Conducta antisocial y delincuencia en la población femenina de 12 a 65 años según edad

Cuadro TI6

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
En los últimos 12 meses usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	214 854	3.2	129 272	0.8	61 547	0.3	136 296	1.9	104 626	0.6	53 075	0.3
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja etc.	58 814	0.9	47 002	0.3	47 837	0.3	80 008	1.1	98 314	0.6	55 319	0.3
Vendido drogas	2 347	***	5 939	***	3 601	***	10 796	0.2	9 551	0.1	9 654	***
Tomado parte en riñas o peleas	335 019	5.1	299 655	1.8	103 137	0.6	265 868	3.8	281 822	1.6	193 136	1.0
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	9 595	0.1	748	***	9 751	0.1	1 673	***	7 742	***	5 868	***

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo

Cuadro TI7

N por subgrupo	Encuestas Nacionales												
	2011						2016						
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Considera que estas sustancias producen adicción:													
Mariguana	34 524 521	89.7	37 237 357	90.6	71 761 878	90.1	33 469 463	81.3	36 617 046	83.0	70 086 509	82.2	
Alucinógenos	29 270 979	76.0	30 689 928	74.6	59 960 907	75.3	24 046 824	58.4	25 410 222	57.6	49 457 046	58.0	
Cocaína	34 930 828	90.7	37 027 476	90.1	71 958 304	90.4	32 317 865	78.5	34 035 228	77.2	66 353 093	77.8	
Heroína	32 817 043	85.2	34 585 849	84.1	67 402 892	84.7	28 311 859	68.8	29 771 144	67.5	58 083 003	68.1	
Inhalables	31 543 112	81.9	33 694 244	82.0	65 237 356	81.9	25 896 208	62.9	27 460 101	62.3	53 356 309	62.6	
Alcohol	33 196 957	86.2	35 496 487	86.3	68 693 444	86.3	30 692 090	74.6	33 600 826	76.2	64 292 916	75.4	
Tabaco	32 607 959	84.7	34 517 125	84.0	67 125 084	84.3	30 020 347	72.9	32 470 841	73.6	62 491 188	73.3	

Porcentajes obtenidos según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Percepción de la población sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según edad

Cuadro TI8

	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
N por subgrupo	29 754 276		15 388 877		34 478 059		31 861 406		16 499 064		36 901 588	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Considera que estas sustancias producen adicción:												
Mariguana	26 751 923	89.9	14 067 386	91.4	30 942 569	89.7	25 959 258	81.5	13 566 411	82.2	30 560 840	82.8
Alucinógenos	21 419 939	72.0	12 264 511	79.7	26 276 457	76.2	17 445 708	54.8	10 030 150	60.8	21 981 188	59.6
Cocaína	26 667 864	89.6	14 225 386	92.4	31 065 054	90.1	24 243 485	76.1	13 280 274	80.5	28 829 335	78.1
Heroína	24 694 318	83.0	13 516 867	87.8	29 191 707	84.7	21 255 819	66.7	11 558 222	70.1	25 268 962	68.5
Inhalables	24 007 602	80.7	13 142 495	85.4	28 087 259	81.5	19 305 571	60.6	10 753 313	65.2	23 297 426	63.1
Alcohol	25 408 791	85.4	13 535 589	88.0	29 749 064	86.3	23 581 593	74.0	12 652 696	76.7	28 058 627	76.0
Tabaco	25 058 975	84.2	13 280 874	86.3	28 785 235	83.5	23 316 444	73.2	12 186 684	73.9	26 988 061	73.1

Porcentajes obtenidos según edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo

Cuadro TI9

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Rehabilitación más efectiva para un adicto:												
Que los metan en la cárcel	718 745	1.9	525 537	1.3	1 244 281	1.6	608 848	1.5	453 768	1.0	1 062 616	1.3
Que los internen en hospitales psiquiátricos	7 305 153	19.3	7 057 360	17.6	14 362 513	18.4	1 577 001	3.9	1 510 778	3.5	3 087 779	3.7
Que se curen en su propio ambiente	6 961 957	18.4	7 105 395	17.7	14 067 353	18.1	2 542 132	6.3	1 980 221	4.6	4 522 353	5.4
Que se curen por su propia cuenta	3 007 630	8.0	2 814 767	7.0	5 822 398	7.5	2 477 075	6.1	1 827 816	4.2	4 304 891	5.1

Porcentajes obtenidos según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según edad

Cuadro TI10

	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
N por subgrupo												
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Rehabilitación más efectiva para un adicto:												
Que los metan en la cárcel	593 226	2.0	194 727	1.3	456 329	1.4	574 928	1.8	140 608	0.9	347 080	1.0
Que los internen en hospitales psiquiátricos	7 068 680	24.3	2 273 070	15.1	5 020 762	14.9	1 624 039	5.2	367 706	2.3	1 096 034	3.0
Que se curen en su propio ambiente	5 656 008	19.4	2 630 446	17.5	5 780 898	17.2	1 732 351	5.5	837 781	5.1	1 952 222	5.4
Que se curen por su propia cuenta	2 125 997	7.3	1 163 560	7.7	2 532 841	7.5	1 567 566	5.0	953 231	5.8	1 784 094	4.9

Porcentajes obtenidos según edad.



ANEXO 8: TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Listado de Tablas

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (1)

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (1)

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (1)

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (2)

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (2)

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (2)

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen según sexo

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen según edad

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma según sexo

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma según edad

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas según sexo

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas según edad

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según sexo

Cuadro TRI1

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	24.6	25.5	25.0	47.6	48.3	48.0	41.7	44.4	43.1
Noroccidental	32.0	37.4	34.7	44.7	51.2	47.9	45.2	50.6	47.9
Nororiental	27.5	28.2	27.9	35.8	43.9	39.9	40.9	44.1	42.5
Occidental	29.1	31.4	30.3	35.6	38.7	37.2	45.3	46.5	46.0
Centro	28.2	35.3	31.9	40.5	45.5	43.1	45.7	50.5	48.2
Ciudad de México	30.0	31.4	30.7	34.6	40.4	37.7	39.0	44.5	41.9
Centro Sur	29.5	30.3	29.9	40.2	48.3	44.4	47.4	53.4	50.6
Sur	31.0	33.4	32.2	50.3	49.5	49.9	47.1	53.3	50.3
Nacional	28.9	32.4	30.7	40.8	45.7	43.3	44.7	49.4	47.1

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI2

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	53.1	22.6	15.5	76.1	47.4	37.6	65.0	43.9	33.8
Noroccidental	57.1	33.7	26.5	76.6	45.4	39.7	68.6	49.5	38.8
Nororiental	56.1	26.1	18.4	62.2	42.1	29.9	68.1	47.4	29.2
Occidental	58.5	26.4	21.3	61.5	36.3	28.3	62.5	47.9	37.5
Centro	55.3	30.0	23.0	67.0	43.5	33.1	70.3	48.3	39.3
Ciudad de México	52.3	32.6	22.5	70.0	37.0	29.9	71.1	43.8	32.8
Centro Sur	51.6	26.5	22.2	65.8	41.6	37.8	64.8	51.1	44.0
Sur	50.1	31.3	23.7	65.5	47.8	45.0	65.4	50.4	43.3
Nacional	54.3	28.9	22.0	67.2	42.6	34.7	67.3	48.3	38.3

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI3

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	51.0	22.3	14.9	72.3	49.4	36.2	60.7	41.5	34.1
Noroccidental	54.9	30.0	24.3	70.3	44.7	34.9	65.3	45.3	37.5
Nororiental	58.0	25.5	17.2	55.1	38.0	26.6	64.7	46.0	27.3
Occidental	55.4	25.4	20.4	59.5	32.6	28.4	61.1	46.3	37.6
Centro	48.4	26.2	20.6	68.2	38.1	30.6	66.2	46.7	35.9
Ciudad de México	45.5	30.2	24.8	69.5	32.5	26.7	69.8	38.0	30.7
Centro Sur	47.6	26.7	22.6	58.6	36.1	35.4	58.7	47.4	42.2
Sur	49.3	29.8	22.4	60.7	47.2	48.6	60.7	48.4	39.2
Nacional	50.4	26.9	21.0	64.1	39.0	32.8	63.3	45.7	36.1

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI4

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	55.3	22.9	16.0	80.0	45.5	39.0	69.5	46.3	33.5
Noroccidental	59.4	37.3	28.6	83.3	46.0	44.4	72.0	53.7	40.1
Nororiental	54.2	26.8	19.5	69.7	46.1	33.0	71.5	48.7	30.9
Occidental	61.7	27.3	22.2	63.5	39.8	28.1	64.0	49.4	37.4
Centro	61.9	33.5	25.1	65.9	48.3	35.4	74.4	49.7	42.4
Ciudad de México	58.7	34.9	20.6	70.5	41.4	32.6	72.4	49.4	34.5
Centro Sur	55.4	26.4	21.9	73.2	46.5	39.9	71.0	54.3	45.6
Sur	50.9	32.7	25.0	70.4	48.3	41.5	70.1	52.1	47.2
Nacional	58.0	30.7	22.9	70.4	46.0	36.4	71.3	50.7	40.2

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI5

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	39.4	17.5	15.5	62.6	41.8	37.6	56.9	37.4	33.8
Noroccidental	47.2	28.6	26.5	60.8	40.9	39.7	62.6	41.3	38.8
Nororiental	43.6	18.6	18.4	54.7	34.9	29.9	58.2	42.1	29.2
Occidental	43.1	22.8	21.3	48.4	33.6	28.3	57.4	41.1	37.5
Centro	43.8	26.5	23.0	60.0	34.3	33.1	62.2	40.5	39.3
Ciudad de México	45.3	24.9	22.5	53.5	32.6	29.9	57.2	41.3	32.8
Centro Sur	40.8	23.2	22.2	54.2	38.4	37.8	59.0	49.0	44.0
Sur	43.1	25.1	23.7	58.8	42.0	45.0	59.9	44.7	43.3
Nacional	43.2	24.2	22.0	56.9	36.5	34.7	59.8	42.4	38.3

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI6

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	38.3	17.5	14.9	61.2	44.2	36.2	52.0	37.8	34.1
Noroccidental	45.0	23.8	24.3	58.8	38.4	34.9	60.0	32.6	37.5
Nororiental	43.5	19.2	17.2	49.6	28.1	26.6	56.5	39.1	27.3
Occidental	40.3	23.5	20.4	43.9	33.4	28.4	53.8	44.0	37.6
Centro	39.3	21.0	20.6	61.7	23.4	30.6	59.8	36.4	35.9
Ciudad de México	39.3	24.3	24.8	52.6	26.7	26.7	51.4	38.5	30.7
Centro Sur	39.2	22.9	22.6	46.8	34.1	35.4	54.6	43.9	42.2
Sur	42.9	21.6	22.4	56.7	39.6	48.6	58.7	38.5	39.2
Nacional	40.6	21.7	21.0	54.5	30.6	32.8	56.8	38.8	36.1

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI7

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	40.4	17.4	16.0	64.1	39.8	39.0	62.1	37.0	33.5
Noroccidental	49.3	33.4	28.6	62.7	43.6	44.4	65.6	48.7	40.1
Nororiental	43.6	18.1	19.5	60.5	40.4	33.0	59.9	44.8	30.9
Occidental	45.7	22.2	22.2	53.0	33.7	28.1	61.0	38.5	37.4
Centro	48.0	31.2	25.1	58.4	44.7	35.4	64.7	43.5	42.4
Ciudad de México	51.2	25.4	20.6	54.4	38.8	32.6	63.4	43.9	34.5
Centro Sur	42.3	23.5	21.9	62.1	41.3	39.9	63.4	53.0	45.6
Sur	43.3	28.3	25.0	60.9	44.0	41.5	61.1	50.2	47.2
Nacional	45.7	26.3	22.9	59.4	41.7	36.4	63.0	45.5	40.2

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, según sexo

Cuadro TRI8

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.2	0.8	1.5	1.5	1.4	1.5	2.7	0.6	1.6
Noroccidental	1.8	0.5	1.2	1.9	0.7	1.3	2.1	0.5	1.3
Nororiental	2.5	0.4	1.4	2.9	0.7	1.8	1.4	0.3	0.8
Occidental	1.8	0.7	1.3	1.4	1.5	1.5	2.0	0.8	1.4
Centro	1.1	0.2	0.6	2.1	0.7	1.4	1.6	0.5	1.0
Ciudad de México	1.5	0.2	0.8	0.8	0.9	0.9	3.0	1.3	2.1
Centro Sur	1.1	0.8	0.9	2.4	1.3	1.8	1.8	0.8	1.3
Sur	1.2	0.4	0.8	1.9	1.2	1.5	1.4	0.8	1.1
Nacional	1.5	0.5	1.0	2.0	1.0	1.5	1.9	0.7	1.2

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, según edad

Cuadro TRI9

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	5.4	0.9	0.4	3.5	1.5	0.7	3.2	1.9	0.8
Noroccidental	3.7	1.2	0.1	3.5	0.9	0.9	2.1	1.8	0.5
Nororiental	3.0	1.0	1.3	4.9	1.8	0.5	2.3	0.8	0.3
Occidental	2.1	2.0	0.2	5.7	0.6	0.6	3.7	1.3	0.5
Centro	1.5	0.5	0.4	3.9	1.5	0.2	3.2	0.7	0.5
Ciudad de México	1.0	0.6	1.0	2.5	1.1	0.2	4.9	2.8	0.8
Centro Sur	2.3	0.6	0.5	4.4	2.3	0.3	3.3	1.1	0.6
Sur	1.5	0.6	0.5	4.1	0.9	1.0	2.1	1.2	0.6
Nacional	2.3	0.8	0.5	4.2	1.4	0.5	3.1	1.2	0.5

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, según edad

Cuadro TRI10

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	8.1	1.1	0.4	4.1	1.7	0.4	4.0	3.4	1.5
Noroccidental	5.6	1.8	0.1	5.3	1.2	1.4	2.9	3.1	0.9
Nororiental	5.0	1.6	2.6	8.9	2.9	0.5	3.6	1.6	0.4
Occidental	3.4	2.6	0.3	5.8	0.9	0.1	4.8	2.3	0.4
Centro	2.4	1.0	0.7	5.4	2.4	0.5	4.2	1.4	0.7
Ciudad de México	--	1.3	2.2	1.1	1.3	0.2	8.4	3.0	1.3
Centro Sur	3.1	0.8	0.2	5.0	3.6	0.1	4.2	1.5	1.1
Sur	2.1	1.0	0.9	3.0	1.0	2.1	2.9	1.2	1.0
Nacional	3.4	1.3	0.8	5.1	2.1	0.6	4.2	1.9	0.8

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, según edad

Cuadro TRI11

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.0	0.8	0.4	2.9	1.3	0.9	2.3	0.5	0.2
Noroccidental	1.7	0.6	--	1.7	0.7	0.4	1.3	0.4	0.2
Nororiental	1.2	0.3	0.1	0.8	0.8	0.5	1.1	0.1	0.2
Occidental	0.7	1.5	0.1	5.6	0.3	1.0	2.5	0.3	0.6
Centro	0.7	0.1	0.1	2.4	0.7	--	2.2	0.1	0.3
Ciudad de México	1.8	--	--	3.9	0.9	0.2	1.2	2.6	0.4
Centro Sur	1.5	0.4	0.9	3.8	1.1	0.5	2.4	0.8	0.1
Sur	0.9	0.3	0.2	5.3	0.7	--	1.2	1.3	0.2
Nacional	1.1	0.4	0.2	3.2	0.8	0.3	1.9	0.6	0.3

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, según sexo

Cuadro TRI12

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.6	0.5	1.0	1.5	0.6	1.0	1.4	0.6	1.0
Noroccidental	0.6	***	0.3	0.3	0.1	0.2	0.9	0.4	0.7
Nororiental	0.9	0.4	0.6	1.4	0.9	1.2	0.8	0.4	0.6
Occidental	1.0	0.3	0.6	0.7	0.1	0.4	3.1	0.9	2.0
Centro	1.3	0.2	0.7	1.0	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5
Ciudad de México	1.5	0.5	0.9	1.6	0.3	0.9	1.1	0.4	0.7
Centro Sur	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	1.1	0.8	1.0
Sur	0.4	0.3	0.4	0.7	0.4	0.5	0.9	0.5	0.7
Nacional	1.0	0.3	0.6	0.9	0.4	0.7	1.1	0.5	0.8

Porcentajes obtenidos según sexo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, según edad

Cuadro TRI13

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.8	1.1	0.6	0.7	1.9	0.4	1.1	1.0	1.0
Noroccidental	0.1	0.6	--	0.3	0.2	0.1	0.9	0.9	0.3
Nororiental	0.3	0.7	0.7	3.0	1.1	0.5	1.2	0.8	0.2
Occidental	0.7	0.6	0.6	0.7	0.2	0.4	2.4	0.9	2.9
Centro	0.8	1.1	0.2	0.8	1.2	0.1	0.7	0.6	0.3
Ciudad de México	1.7	0.4	1.2	2.7	1.4	***	0.9	1.3	0.3
Centro Sur	0.8	0.5	0.5	0.9	0.9	0.1	1.4	1.2	0.6
Sur	0.6	0.3	0.3	1.0	0.3	0.5	0.7	0.6	0.7
Nacional	0.8	0.7	0.4	1.1	0.9	0.2	1.1	0.8	0.7

Porcentajes obtenidos según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población masculina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, según edad

Cuadro TRI14

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	3.0	2.1	0.3	0.8	3.3	0.3	1.5	1.6	1.3
Noroccidental	0.3	1.2	--	0.5	0.3	0.1	0.7	1.4	0.4
Nororiental	0.7	1.1	0.7	3.8	2.0	--	1.4	1.3	0.1
Occidental	0.5	1.3	0.9	1.2	0.3	0.8	1.4	1.4	5.6
Centro	1.1	2.4	0.1	1.0	2.0	--	0.8	0.7	0.4
Ciudad de México	--	0.8	2.7	4.9	2.2	0.1	1.2	1.9	0.5
Centro Sur	1.0	0.1	0.6	0.2	1.8	--	1.3	1.3	0.9
Sur	0.6	0.2	0.5	0.9	0.6	0.7	1.0	0.8	0.9
Nacional	0.9	1.3	0.6	1.3	1.6	0.2	1.1	1.2	1.1

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población femenina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, según edad

Cuadro TRI15

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	0.2	0.2	0.8	0.6	0.5	0.5	0.8	0.4	0.8
Noroccidental	--	0.1	--	--	--	0.2	1.2	0.4	0.2
Nororiental	--	0.3	0.6	2.1	0.4	1.1	1.1	0.3	0.2
Occidental	0.8	***	0.2	0.2	--	0.1	3.4	0.4	0.4
Centro	0.4	--	0.2	0.6	0.5	0.2	0.6	0.5	0.1
Ciudad de México	3.0	0.1	--	0.5	0.7	--	0.6	0.6	0.1
Centro Sur	0.5	0.7	0.4	1.6	0.1	0.1	1.6	1.1	0.3
Sur	0.6	0.4	0.1	1.2	--	0.4	0.3	0.5	0.5
Nacional	0.6	0.2	0.3	0.9	0.3	0.3	1.1	0.6	0.3

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas, según sexo

Cuadro TRI16

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	6.1	1.3	3.7	7.1	1.6	4.3	6.0	1.7	3.8
Noroccidental	3.8	1.1	2.4	5.1	1.3	3.2	4.1	1.2	2.6
Nororiental	5.1	1.8	3.4	6.1	2.2	4.2	6.5	2.0	4.2
Occidental	3.9	1.2	2.5	6.9	2.2	4.5	9.6	2.3	5.8
Centro	3.5	1.0	2.2	7.0	2.7	4.8	6.3	1.7	3.9
Ciudad de México	5.2	1.7	3.3	4.1	1.8	2.9	7.1	2.0	4.5
Centro Sur	3.7	1.0	2.3	5.6	0.6	3.0	6.2	1.6	3.8
Sur	1.9	0.4	1.1	2.5	0.6	1.5	5.2	0.9	3.0
Nacional	3.9	1.1	2.5	5.8	1.8	3.7	6.4	1.7	4.0

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas, según edad

Cuadro TRI17

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	8.0	3.8	1.6	9.7	5.0	1.5	5.0	4.8	2.5
Noroccidental	4.2	3.3	0.7	7.8	3.4	1.2	4.1	3.6	1.2
Nororiental	8.9	2.9	1.7	10.8	5.4	0.6	6.4	5.3	2.5
Occidental	3.9	3.2	1.2	12.7	3.7	2.0	8.6	5.8	4.8
Centro	3.8	2.2	1.4	11.3	5.7	1.2	6.1	4.6	2.3
Ciudad de México	7.7	3.6	1.6	7.1	4.3	0.8	3.8	6.4	3.2
Centro Sur	4.8	2.3	1.0	4.6	4.3	1.1	6.2	3.7	2.8
Sur	3.2	0.8	0.3	3.9	1.5	0.5	3.1	3.6	2.4
Nacional	4.9	2.6	1.2	8.8	4.5	1.1	5.7	4.6	2.7

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas, según edad

Cuadro TRI18

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	11.4	6.8	2.7	14.0	8.6	2.9	6.1	7.9	4.0
Noroccidental	6.9	5.0	0.9	11.5	6.1	1.7	5.1	6.3	1.6
Nororiental	14.1	4.5	2.4	16.1	7.8	0.8	9.1	8.6	3.6
Occidental	5.2	5.5	1.7	17.2	6.5	2.9	11.2	9.8	8.6
Centro	5.2	3.7	2.5	15.2	8.7	1.8	8.3	7.8	4.1
Ciudad de México	9.7	6.8	2.3	10.5	5.8	1.0	3.8	10.6	5.2
Centro Sur	8.0	3.1	1.9	7.6	8.6	1.9	8.3	6.2	5.1
Sur	4.7	1.7	0.5	5.1	2.7	1.0	4.4	6.6	4.1
Nacional	7.2	4.3	2.0	12.4	7.3	1.8	7.6	7.8	4.5

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas, según edad

Cuadro TRI19

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	3.8	1.1	0.6	5.3	1.5	0.2	3.8	1.6	1.0
Noroccidental	1.4	1.6	0.4	3.9	0.8	0.8	3.0	1.0	0.7
Nororiental	4.5	1.4	1.1	5.4	3.1	0.4	3.6	2.1	1.4
Occidental	2.4	1.1	0.8	8.2	1.1	1.1	5.9	2.0	1.3
Centro	2.3	1.0	0.5	7.3	3.0	0.7	3.8	1.7	0.8
Ciudad de México	6.2	1.1	0.9	3.8	2.8	0.7	3.8	2.2	1.5
Centro Sur	1.7	1.7	0.1	1.5	0.5	0.4	4.1	1.5	0.8
Sur	1.8	0.1	0.2	2.6	0.3	--	1.7	0.7	0.7
Nacional	2.6	1.1	0.5	5.1	1.8	0.6	3.8	1.6	1.0

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



**ANEXO 9: INTERVALOS
DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Listado de Tablas

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención según sexo y edad (1)

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención según sexo y edad (2)

Población de 12 a 65 años que ha presentado conductas antisociales y actos delictivos según sexo y edad (1)

Población de 12 a 65 años que ha presentado conductas antisociales y actos delictivos según sexo y edad (2)

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo y edad (1)

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo y edad (2)

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo y edad (1)

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo y edad (2)

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención según sexo y edad

Cuadro ICI1

Sexo/Edad	%	IC 95%
Hombres		
12-17	63.3	61.361-65.327
18-34	45.7	43.606-47.829
35-65	36.1	34.405-37.841
Subtotal	44.7	43.524-45.968
Mujeres		
12-17	71.3	69.479-73.171
18-34	50.7	48.895-52.441
35-65	40.2	38.904-41.427
Subtotal	49.4	48.365-50.361
Total 12-17	67.3	65.894-68.685
Total 18-34	48.3	46.882-49.671
Total 35-65	38.3	37.200-39.300
Total	47.1	46.334-47.933

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención según sexo y edad

Cuadro ICI2

Sexo/Edad	%	IC 95%
Hombres		
12-25	56.8	54.824-58.759
26-34	38.8	36.061-41.561
35-65	36.1	34.405-37.841
Subtotal	44.7	43.524-45.968
Mujeres		
12-25	63.0	61.441-64.584
26-34	45.5	43.067-47.866
35-65	40.2	38.904-41.427
Subtotal	49.4	48.365-50.361
Total 12-25	59.8	58.536-61.162
Total 26-34	42.4	40.633-44.263
Total 35-65	38.3	37.200-39.300
Total	47.1	46.334-47.933

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha presentado conductas antisociales y actos delictivos según sexo y edad

Cuadro ICI3

Sexo/Edad	Tomar dinero o cosas de valor		Atacar a alguien con algún objeto	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres				
12-17	4.2	3.433-5.006	1.1	0.751-1.400
18-34	1.9	1.401-2.431	1.2	0.791-1.525
35-65	0.8	0.603-1.091	1.1	0.025-2.204
Subtotal	1.9	1.599-2.136	1.1	0.636-1.614
Mujeres				
12-17	1.9	1.355-2.491	1.1	0.402-1.856
18-34	0.6	0.260-0.929	0.6	0.312-0.806
35-65	0.3	0.113-0.434	0.3	0.194-0.376
Subtotal	0.7	0.491-0.843	0.5	0.372-0.687
Total 12-17	3.1	2.600-3.569	1.1	0.710-1.494
Total 18-34	1.2	0.930-1.536	0.8	0.630-1.066
Total 35-65	0.5	0.403-0.687	0.7	0.157-1.199
Total	1.2	1.089-1.404	0.8	0.566-1.068

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha presentado conductas antisociales y actos delictivos según sexo y edad

Cuadro ICI4

Sexo/Edad	Tomar parte en riñas o peleas		Usar cuchillo o pistola para obtener objetos	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres				
12-17	7.6	6.590-8.602	0.2	0.083-0.345
18-34	7.8	6.726-8.935	0.4	0.131-0.642
35-65	4.5	3.338-5.754	0.3	0.133-0.529
Subtotal	6.4	5.704-7.085	0.3	0.199-0.467
Mujeres				
12-17	3.8	2.838-4.665	***	---
18-34	1.6	1.195-2.009	***	0.004-0.084
35-65	1.0	0.736-1.253	***	0.002-0.058
Subtotal	1.7	1.431-1.929	***	0.014-0.055
Total 12-17	5.7	5.023-6.367	0.1	0.052-0.188
Total 18-34	4.6	4.024-5.198	0.2	0.084-0.335
Total 35-65	2.7	2.082-3.272	0.2	0.078-0.268
Total	4.0	3.588-4.325	0.2	0.113-0.244

***Porcentaje obtenido menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo y edad

Cuadro ICI5

Sexo/Edad	Mariguana		Alucinógenos		Cocaína		Heroína	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	81.3	80.337-82.260	58.4	57.098-59.723	78.5	77.498-79.504	68.8	67.499-70.042
Mujeres	83.0	82.246-83.843	57.6	56.540-58.716	77.2	76.312-78.066	67.5	66.464-68.573
Total	82.2	81.514-82.888	58.0	57.029-58.983	77.8	77.078-78.567	68.1	67.173-69.073
Total 12-25	81.5	80.362-82.590	54.8	53.242-56.268	76.1	74.960-77.221	66.7	65.377-68.049
Total 26-34	82.2	80.873-83.577	60.8	58.995-62.589	80.5	79.069-81.913	70.1	68.210-71.897
Total 35-65	82.8	81.922-83.712	59.6	58.384-60.750	78.1	77.194-79.056	68.5	67.322-69.631

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo y edad

Cuadro ICI6

Sexo/Edad	Inhalables		Alcohol		Tabaco	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	62.9	61.536-64.270	74.6	73.336-75.769	72.9	71.668-74.173
Mujeres	62.3	61.123-63.431	76.2	75.244-77.163	73.6	72.631-74.651
Total	62.6	61.545-63.613	75.4	74.535-76.277	73.3	72.374-74.212
Total 12-25	60.6	59.100-62.085	74.0	72.800-75.226	73.2	71.909-74.452
Total 26-34	65.2	63.319-67.032	76.7	75.043-78.332	73.9	72.150-75.576
Total 35-65	63.1	61.932-64.336	76.0	74.945-77.128	73.1	72.028-74.243

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo y edad

Cuadro ICI7

Sexo/Edad	Que los metan en la cárcel		Que los internen en hospitales psiquiátricos		Curarles en su propio ambiente	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	1.5	1.280-1.762	3.9	3.548-4.266	6.3	5.594-7.029
Mujeres	1.0	0.895-1.220	3.5	3.145-3.848	4.6	4.144-5.017
Total	1.3	1.127-1.421	3.7	3.433-3.940	5.4	4.975-5.832
Total 12-25	1.8	1.567-2.152	5.2	4.737-5.679	5.5	4.931-6.205
Total 26-34	0.9	0.636-1.169	2.3	1.854-2.745	5.1	4.317-6.113
Total 35-65	1.0	0.796-1.145	3.0	2.668-3.407	5.4	4.725-6.101

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo y edad

Cuadro ICI8

	Que se curen por su propia cuenta		Que los internen en un centro de rehabilitación		Que los internen en un anexo		Otra	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	6.1	5.504-6.783	71.5	70.345-72.713	8.0	7.236-8.785	2.7	2.391-3.047
Mujeres	4.2	3.857-4.592	75.8	74.906-76.661	8.2	7.654-8.853	2.7	2.366-3.030
Total	5.1	4.756-5.528	73.7	72.966-74.504	8.1	7.631-8.615	2.7	2.459-2.940
Total 12-25	5.0	4.459-5.620	72.0	70.693-73.217	8.8	7.888-9.908	1.6	1.300-2.005
Total 26-34	5.8	4.836-7.060	75.3	73.608-76.994	8.2	7.399-9.116	2.3	1.887-2.881
Total 35-65	4.9	4.455-5.406	74.6	73.518-75.556	7.4	6.882-8.011	3.8	3.391-4.194

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



**ANEXO 10: INTERVALOS
DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN
A LA PREVENCIÓN Y CONDUCTA
ANTISOCIAL POR ESTADO**



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

Listado de Tablas

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según sexo

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (1)

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (1)

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (1)

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (2)

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (2)

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (2)

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por estado según sexo

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por estado según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por estado según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por estado según edad

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por estado según sexo

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por estado según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por estado según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por estado según edad

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por estado según sexo

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por estado según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por estado según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por estado según edad

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según sexo**

Cuadro ICEI1

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	40.7	35.816-45.485	47.1	43.910-50.339	44.0	40.829-47.220
Baja California	42.9	38.584-47.307	48.3	44.416-52.154	45.6	42.605-48.571
Baja California Sur	43.7	39.584-47.850	50.5	46.857-54.145	47.0	44.002-50.034
Campeche	54.3	49.518-59.053	51.9	48.224-55.637	53.1	50.124-56.036
Chiapas	44.4	39.525-49.344	56.9	53.243-60.512	50.9	47.650-54.179
Chihuahua	41.2	36.334-46.099	42.8	37.683-47.848	42.0	38.099-45.904
Ciudad de México	39.0	34.375-43.627	44.5	40.317-48.611	41.9	38.491-45.217
Coahuila	40.4	35.133-45.693	41.8	37.871-45.794	41.1	37.643-44.619
Colima	45.1	38.620-51.620	49.7	45.201-54.121	47.4	43.236-51.576
Durango	45.1	40.299-49.869	51.9	47.548-56.319	48.6	45.342-51.906
Estado de México	45.7	40.106-51.268	49.9	45.796-53.949	47.9	44.673-51.047
Guanajuato	46.8	42.663-50.874	46.8	43.386-50.297	46.8	44.121-49.493
Guerrero	46.5	42.341-50.719	52.2	48.467-55.890	49.5	46.328-52.631
Hidalgo	50.6	46.240-55.056	58.5	54.152-62.884	54.8	51.549-58.020
Jalisco	44.6	37.975-51.193	44.1	38.267-49.889	44.3	39.730-48.918
Michoacán	43.9	39.548-48.179	43.7	39.662-47.670	43.8	41.007-46.514
Morelos	42.5	38.171-46.800	44.6	39.967-49.220	43.6	40.136-47.046
Nayarit	50.8	46.460-55.078	48.3	44.304-52.267	49.5	46.640-52.380
Nuevo León	37.1	32.456-41.841	38.2	34.119-42.192	37.7	34.562-40.754
Oaxaca	45.4	39.838-50.931	56.7	52.689-60.768	51.4	47.436-55.371
Puebla	42.3	36.802-47.758	51.7	47.889-55.539	47.3	43.602-50.991
Querétaro	45.5	40.722-50.182	53.3	49.311-57.372	49.6	46.550-52.608
Quintana Roo	44.9	40.175-49.564	50.2	45.845-54.516	47.5	44.609-50.353
San Luis Potosí	43.6	37.489-49.708	54.5	50.768-58.330	49.3	45.481-53.110
Sinaloa	48.6	44.537-52.761	52.6	49.106-56.098	50.6	47.649-53.642
Sonora	44.6	40.028-49.246	51.2	47.240-55.220	47.9	44.820-51.058
Tabasco	49.7	44.703-54.629	54.4	50.989-57.748	52.1	49.175-55.019
Tamaulipas	44.5	39.338-49.665	45.1	40.658-49.505	44.8	41.325-48.268
Tlaxcala	50.5	45.682-55.330	56.6	52.466-60.775	53.7	50.133-57.286
Veracruz	50.6	46.012-55.221	57.8	53.900-61.674	54.3	51.157-57.536
Yucatán	48.3	42.881-53.690	47.0	41.412-52.494	47.6	43.850-51.352
Zacatecas	49.1	44.502-53.663	55.7	51.948-59.493	52.6	49.754-55.364
Nacional	44.7	43.524-45.968	49.4	48.365-50.361	47.1	46.334-47.933

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI2

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	59.5	53.553-65.415	45.6	39.982-51.287	35.7	31.617-39.856
Baja California	67.9	62.312-73.398	46.3	40.700-51.919	36.7	32.700-40.749
Baja California Sur	68.5	62.449-74.531	46.2	41.214-51.166	40.3	36.026-44.553
Campeche	72.8	68.248-77.445	54.2	49.224-59.121	43.9	38.909-48.969
Chiapas	64.0	58.071-69.974	49.1	44.054-54.060	45.9	41.659-50.118
Chihuahua	63.2	54.950-71.424	44.0	37.418-50.669	32.3	27.878-36.669
Ciudad de México	71.1	64.118-78.011	43.8	38.158-49.451	32.8	28.825-36.724
Coahuila	64.3	58.226-70.343	41.4	36.104-46.638	32.0	27.723-36.265
Colima	65.2	58.846-71.535	51.5	45.009-58.078	37.1	30.672-43.611
Durango	69.7	65.056-74.323	47.9	42.573-53.257	40.3	35.990-44.575
Estado de México	73.4	67.819-79.007	46.5	40.445-52.623	39.8	35.683-43.854
Guanajuato	64.9	59.276-70.435	46.7	42.434-50.945	38.9	35.407-42.349
Guerrero	62.9	57.567-68.193	48.7	41.797-55.594	43.4	38.140-48.611
Hidalgo	71.2	65.909-76.532	61.3	56.357-66.272	42.3	37.687-46.947
Jalisco	59.0	51.192-66.900	46.7	39.262-54.073	36.3	30.436-42.143
Michoacán	61.7	55.903-67.506	43.9	39.256-48.633	35.7	31.436-39.995
Morelos	66.8	60.966-72.689	48.0	42.131-53.887	31.1	26.824-35.298
Nayarit	72.2	66.178-78.299	49.8	44.510-55.011	40.5	35.988-44.993
Nuevo León	65.5	60.507-70.526	43.8	38.027-49.631	23.4	19.540-27.347
Oaxaca	63.4	56.586-70.117	47.1	40.336-53.808	49.7	44.491-54.940
Puebla	67.5	61.627-73.309	47.1	40.582-53.563	38.4	33.183-43.599
Querétaro	71.3	66.083-76.501	49.6	44.519-54.676	40.6	36.149-44.966
Quintana Roo	64.8	58.731-70.907	47.8	42.513-53.052	40.3	35.968-44.573
San Luis Potosí	74.0	68.763-79.240	52.5	46.467-58.470	35.6	30.279-40.900
Sinaloa	70.4	64.147-76.656	53.3	48.127-58.507	40.7	36.676-44.788
Sonora	67.5	62.086-72.924	50.3	44.945-55.661	38.8	34.988-42.514
Tabasco	63.5	58.405-68.637	54.4	48.922-59.785	45.1	41.060-49.093
Tamaulipas	66.3	61.123-71.511	49.0	42.713-55.199	33.5	29.468-37.502
Tlaxcala	73.9	68.440-79.262	54.6	49.000-60.219	44.2	38.604-49.891
Veracruz	68.3	62.301-74.337	58.0	52.827-63.265	46.0	41.718-50.225
Yucatán	68.4	62.585-74.128	49.1	42.053-56.124	38.4	33.742-43.079
Zacatecas	73.1	67.847-78.297	53.4	47.777-58.951	42.9	38.603-47.280
Nacional	67.3	65.894-68.685	48.3	46.882-49.671	38.3	37.200-39.300

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI3

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	54.5	44.912-64.141	40.5	31.869-49.076	34.4	28.465-40.373
Baja California	64.5	55.766-73.323	40.1	32.444-47.759	37.6	31.327-43.926
Baja California Sur	66.0	57.795-74.203	41.9	34.435-49.374	37.8	31.625-43.916
Campeche	67.0	59.903-73.999	57.0	49.953-64.041	46.3	37.974-54.638
Chiapas	58.6	50.573-66.574	42.3	33.344-51.248	38.8	32.322-45.197
Chihuahua	58.1	45.235-70.977	41.3	32.814-49.719	34.6	28.042-41.138
Ciudad de México	69.8	59.635-79.960	38.0	30.335-45.717	30.7	24.657-36.793
Coahuila	58.2	49.790-66.656	41.3	32.959-49.708	32.1	25.549-38.649
Colima	59.9	51.923-67.953	49.0	39.268-58.651	35.8	24.132-47.491
Durango	69.8	63.009-76.558	42.2	34.129-50.270	36.6	29.586-43.575
Estado de México	69.5	61.556-77.472	44.3	34.810-53.830	37.7	30.095-45.217
Guanajuato	60.2	51.385-69.002	51.9	45.440-58.417	35.2	29.394-41.019
Guerrero	62.0	53.812-70.251	46.4	36.392-56.347	38.2	31.632-44.762
Hidalgo	65.7	58.180-73.311	60.9	53.297-68.483	35.1	28.720-41.483
Jalisco	59.0	49.402-68.634	45.4	35.830-54.921	37.6	26.523-48.691
Michoacán	56.7	48.432-65.004	47.0	39.043-54.995	34.9	28.401-41.377
Morelos	66.3	58.209-74.357	48.9	41.026-56.784	27.2	21.099-33.247
Nayarit	74.4	67.097-81.641	50.9	43.005-58.846	41.1	35.059-47.121
Nuevo León	63.7	55.854-71.491	44.4	35.643-53.182	21.7	16.735-26.762
Oaxaca	59.6	49.438-69.670	36.6	26.846-46.423	45.8	38.052-53.501
Puebla	63.6	54.009-73.190	39.6	29.154-49.976	34.6	27.050-42.247
Querétaro	64.8	55.401-74.200	48.0	40.107-55.811	34.4	27.443-41.280
Quintana Roo	63.6	54.433-72.800	45.2	35.807-54.556	37.0	30.502-43.574
San Luis Potosí	71.8	63.131-80.435	41.8	33.724-49.789	32.2	22.873-41.546
Sinaloa	72.3	64.651-79.858	50.6	43.358-57.756	37.7	31.701-43.658
Sonora	58.6	49.695-67.405	47.2	39.299-55.141	37.1	31.036-43.067
Tabasco	58.3	51.070-65.536	53.4	44.584-62.282	42.1	36.346-47.794
Tamaulipas	59.6	51.118-68.023	51.4	42.650-60.216	32.6	26.593-38.686
Tlaxcala	70.8	63.401-78.181	53.2	44.968-61.415	38.4	31.715-45.128
Veracruz	57.8	49.853-65.708	52.7	43.764-61.724	45.9	39.637-52.148
Yucatán	64.6	56.656-72.449	54.8	45.902-63.796	35.7	28.523-42.945
Zacatecas	67.0	59.086-74.962	52.0	42.560-61.508	37.9	31.438-44.434
Nacional	63.3	61.361-65.327	45.7	43.606-47.829	36.1	34.405-37.841

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI4

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	64.4	57.688-71.109	50.5	44.784-56.152	36.9	32.036-41.735
Baja California	71.3	62.757-79.899	52.6	46.430-58.793	35.8	30.760-40.857
Baja California Sur	71.1	62.592-79.559	50.7	44.530-56.897	43.0	37.532-48.391
Campeche	78.8	72.872-84.786	51.5	45.236-57.847	41.7	35.885-47.491
Chiapas	69.5	61.562-77.490	54.9	49.756-60.097	52.5	46.906-58.171
Chihuahua	68.4	59.210-77.530	46.8	38.763-54.848	30.1	24.305-35.895
Ciudad de México	72.4	62.619-82.262	49.4	42.365-56.441	34.5	29.670-39.309
Coahuila	70.7	62.608-78.796	41.4	34.917-47.900	31.9	26.287-37.509
Colima	70.8	61.870-79.652	54.1	46.593-61.659	38.4	32.490-44.321
Durango	69.6	61.910-77.277	53.3	47.076-59.578	43.6	37.251-49.915
Estado de México	77.4	71.054-83.715	48.6	40.372-56.845	41.6	36.960-46.318
Guanajuato	69.5	62.493-76.487	42.1	36.543-47.572	42.1	38.008-46.130
Guerrero	63.7	55.695-71.764	50.8	43.351-58.290	47.9	41.488-54.325
Hidalgo	76.8	70.306-83.264	61.7	54.945-68.419	48.7	42.107-55.387
Jalisco	59.1	47.214-70.939	47.9	37.857-57.960	35.1	28.189-42.041
Michoacán	66.8	59.462-74.048	41.2	35.342-47.114	36.5	31.031-41.881
Morelos	67.4	58.793-75.968	47.2	39.138-55.263	34.5	28.712-40.194
Nayarit	70.0	61.502-78.539	48.6	41.077-56.192	39.9	33.968-45.870
Nuevo León	67.4	59.921-74.898	43.2	35.420-51.060	25.0	19.874-30.180
Oaxaca	67.2	57.984-76.338	55.5	48.620-62.338	53.3	47.135-59.443
Puebla	71.2	64.013-78.442	53.7	47.564-59.741	41.6	36.065-47.049
Querétaro	77.7	71.548-83.941	51.1	44.534-57.647	46.0	40.618-51.401
Quintana Roo	66.1	56.195-75.980	50.4	43.902-56.977	43.6	37.549-49.714
San Luis Potosí	76.2	70.048-82.447	62.2	54.826-69.488	38.6	33.180-44.090
Sinaloa	68.5	59.358-77.660	56.0	49.519-62.520	43.7	38.743-48.614
Sonora	76.7	69.963-83.370	53.5	46.196-60.760	40.4	35.929-44.830
Tabasco	68.8	61.860-75.769	55.2	49.132-61.274	47.8	42.215-53.435
Tamaulipas	73.1	67.207-79.052	46.5	38.021-55.059	34.3	29.166-39.395
Tlaxcala	77.0	68.855-85.099	55.9	49.623-62.145	49.3	42.241-56.436
Veracruz	79.2	69.642-88.846	62.9	57.235-68.524	46.0	40.743-51.342
Yucatán	72.1	63.442-80.851	43.7	33.807-53.494	40.9	34.820-46.978
Zacatecas	79.5	73.299-85.698	54.5	47.720-61.288	47.4	42.208-52.668
Nacional	71.3	69.479-73.171	50.7	48.895-52.441	40.2	38.904-41.427

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI5

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	55.0	50.148-59.924	38.4	32.227-44.573	35.7	31.617-39.856
Baja California	58.5	53.508-63.514	42.4	35.321-49.386	36.7	32.700-40.749
Baja California Sur	60.5	55.801-65.189	38.8	32.531-44.984	40.3	36.026-44.553
Campeche	68.3	63.951-72.726	42.9	36.866-48.928	43.9	38.909-48.969
Chiapas	58.6	53.859-63.300	44.9	37.861-51.845	45.9	41.659-50.118
Chihuahua	55.6	49.777-61.461	40.1	30.902-49.282	32.3	27.878-36.669
Ciudad de México	57.2	51.362-63.049	41.3	33.116-49.544	32.8	28.825-36.724
Coahuila	56.1	50.579-61.613	31.1	23.924-38.350	32.0	27.723-36.265
Colima	61.3	55.261-67.435	45.0	37.325-52.716	37.1	30.672-43.611
Durango	60.6	55.679-65.538	41.7	35.168-48.179	40.3	35.990-44.575
Estado de México	62.6	56.841-68.336	38.5	30.887-46.139	39.8	35.683-43.854
Guanajuato	57.7	53.624-61.785	41.5	35.715-47.360	38.9	35.407-42.349
Guerrero	61.2	56.941-65.401	39.7	31.316-48.148	43.4	38.140-48.611
Hidalgo	71.8	67.290-76.222	50.9	43.683-58.039	42.3	37.687-46.947
Jalisco	55.2	47.412-62.993	39.0	30.449-47.516	36.3	30.436-42.143
Michoacán	53.7	49.228-58.116	40.9	33.741-48.025	35.7	31.436-39.995
Morelos	62.1	56.659-67.564	36.3	29.253-43.379	31.1	26.824-35.298
Nayarit	63.8	58.753-68.762	43.2	35.908-50.444	40.5	35.988-44.993
Nuevo León	54.0	48.295-59.644	40.1	31.318-48.792	23.4	19.540-27.347
Oaxaca	56.0	50.164-61.881	45.8	36.386-55.229	49.7	44.491-54.940
Puebla	60.0	53.600-66.339	38.9	31.199-46.638	38.4	33.183-43.599
Querétaro	63.9	59.471-68.251	41.8	34.698-48.887	40.6	36.149-44.966
Quintana Roo	57.1	51.928-62.346	41.8	33.997-49.594	40.3	35.968-44.573
San Luis Potosí	63.6	58.496-68.752	50.2	41.715-58.682	35.6	30.279-40.900
Sinaloa	65.9	60.987-70.873	43.3	36.132-50.456	40.7	36.676-44.788
Sonora	64.2	59.254-69.229	38.8	31.682-45.851	38.8	34.988-42.514
Tabasco	60.6	56.117-65.120	49.4	42.888-56.008	45.1	41.060-49.093
Tamaulipas	60.2	54.372-65.953	38.5	31.570-45.483	33.5	29.468-37.502
Tlaxcala	65.7	60.801-70.587	48.3	40.317-56.191	44.2	38.604-49.891
Veracruz	62.8	57.673-68.014	58.5	52.508-64.401	46.0	41.718-50.225
Yucatán	60.7	52.614-68.860	42.3	34.816-49.794	38.4	33.742-43.079
Zacatecas	64.4	59.272-69.547	49.6	42.401-56.842	42.9	38.603-47.280
Nacional	59.8	58.536-61.162	42.4	40.633-44.263	38.3	37.200-39.300

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI6

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	49.0	40.845-57.178	34.8	24.432-45.107	34.4	28.465-40.373
Baja California	55.3	47.130-63.516	32.6	22.615-42.505	37.6	31.327-43.926
Baja California Sur	59.6	52.705-66.503	28.0	19.450-36.548	37.8	31.625-43.916
Campeche	68.0	61.711-74.276	41.9	31.779-52.075	46.3	37.974-54.638
Chiapas	55.9	49.032-62.756	32.4	20.954-43.768	38.8	32.322-45.197
Chihuahua	49.8	42.287-57.272	40.1	27.751-52.485	34.6	28.042-41.138
Ciudad de México	51.4	42.653-60.162	38.5	27.582-49.402	30.7	24.657-36.793
Coahuila	51.6	43.248-60.013	34.2	22.799-45.589	32.1	25.549-38.649
Colima	57.1	49.503-64.764	42.1	28.807-55.458	35.8	24.132-47.491
Durango	56.6	50.026-63.264	38.4	28.521-48.272	36.6	29.586-43.575
Estado de México	59.8	50.903-68.730	33.1	21.047-45.111	37.7	30.095-45.217
Guanajuato	59.0	52.902-65.017	44.9	34.030-55.709	35.2	29.394-41.019
Guerrero	59.0	52.581-65.341	38.8	24.884-52.678	38.2	31.632-44.762
Hidalgo	70.6	63.644-77.514	46.7	35.930-57.411	35.1	28.720-41.483
Jalisco	50.3	40.642-60.046	47.4	34.016-60.792	37.6	26.523-48.691
Michoacán	53.1	46.101-60.005	43.2	31.810-54.510	34.9	28.401-41.377
Morelos	60.8	53.496-68.170	37.9	27.160-48.730	27.2	21.099-33.247
Nayarit	67.4	60.383-74.448	39.4	29.255-49.578	41.1	35.059-47.121
Nuevo León	51.8	43.321-60.212	44.8	31.307-58.231	21.7	16.735-26.762
Oaxaca	51.6	43.307-59.842	31.5	18.567-44.364	45.8	38.052-53.501
Puebla	54.3	44.324-64.193	29.1	18.186-40.068	34.6	27.050-42.247
Querétaro	61.0	53.632-68.375	37.6	26.206-49.024	34.4	27.443-41.280
Quintana Roo	55.4	46.019-64.731	37.8	26.217-49.364	37.0	30.502-43.574
San Luis Potosí	58.0	50.366-65.659	36.2	23.864-48.595	32.2	22.873-41.546
Sinaloa	68.2	62.414-74.017	31.8	22.440-41.257	37.7	31.701-43.658
Sonora	56.8	49.798-63.832	35.2	24.863-45.499	37.1	31.036-43.067
Tabasco	59.4	52.032-66.778	43.7	32.007-55.419	42.1	36.346-47.794
Tamaulipas	62.2	53.805-70.588	32.3	22.472-42.065	32.6	26.593-38.686
Tlaxcala	64.3	56.970-71.714	42.8	30.979-54.596	38.4	31.715-45.128
Veracruz	55.2	46.709-63.732	52.6	42.557-62.599	45.9	39.637-52.148
Yucatán	62.7	54.227-71.114	47.4	34.934-59.799	35.7	28.523-42.945
Zacatecas	63.8	56.442-71.185	38.0	23.463-52.543	37.9	31.438-44.434
Nacional	56.8	54.824-58.759	38.8	36.061-41.561	36.1	34.405-37.841

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI7

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	61.1	55.976-66.192	41.5	34.652-48.310	36.9	32.036-41.735
Baja California	62.0	55.483-68.477	51.5	43.423-59.521	35.8	30.760-40.857
Baja California Sur	61.5	55.524-67.527	48.5	40.812-56.185	43.0	37.532-48.391
Campeche	68.7	62.783-74.626	43.7	36.347-50.960	41.7	35.885-47.491
Chiapas	61.0	55.185-66.833	56.4	48.967-63.911	52.5	46.906-58.171
Chihuahua	61.9	54.361-69.355	40.1	30.508-49.630	30.1	24.305-35.895
Ciudad de México	63.4	55.965-70.775	43.9	34.793-53.037	34.5	29.670-39.309
Coahuila	61.0	54.956-66.970	28.3	20.030-36.596	31.9	26.287-37.509
Colima	66.1	57.877-74.261	47.5	39.629-55.365	38.4	32.490-44.321
Durango	64.5	57.667-71.307	44.8	36.785-52.757	43.6	37.251-49.915
Estado de México	65.6	59.086-72.203	42.5	31.265-53.803	41.6	36.960-46.318
Guanajuato	56.5	50.347-62.601	38.9	31.645-46.086	42.1	38.008-46.130
Guerrero	63.3	56.634-69.958	40.6	32.168-49.029	47.9	41.488-54.325
Hidalgo	72.9	67.521-78.228	54.4	44.452-64.351	48.7	42.107-55.387
Jalisco	60.1	50.991-69.117	30.8	21.185-40.514	35.1	28.189-42.041
Michoacán	54.3	48.273-60.337	39.2	30.867-47.529	36.5	31.031-41.881
Morelos	63.5	56.631-70.308	35.1	25.857-44.435	34.5	28.712-40.194
Nayarit	59.9	53.098-66.686	46.5	36.378-56.551	39.9	33.968-45.870
Nuevo León	56.2	48.422-64.046	35.4	24.750-46.074	25.0	19.874-30.180
Oaxaca	60.0	53.073-66.873	57.7	49.247-66.178	53.3	47.135-59.443
Puebla	65.7	60.114-71.217	46.0	36.258-55.818	41.6	36.065-47.049
Querétaro	66.7	59.813-73.551	45.3	36.787-53.884	46.0	40.618-51.401
Quintana Roo	59.1	52.309-65.792	45.5	37.012-53.983	43.6	37.549-49.714
San Luis Potosí	69.3	63.562-75.120	61.1	51.423-70.802	38.6	33.180-44.090
Sinaloa	63.5	56.884-70.066	52.9	43.461-62.427	43.7	38.743-48.614
Sonora	73.4	67.497-79.363	41.4	30.954-51.801	40.4	35.929-44.830
Tabasco	61.9	56.278-67.498	53.9	46.660-61.056	47.8	42.215-53.435
Tamaulipas	58.1	50.561-65.632	44.3	34.778-53.729	34.3	29.166-39.395
Tlaxcala	67.1	61.110-73.138	52.1	43.189-61.019	49.3	42.241-56.436
Veracruz	71.2	65.167-77.248	62.8	55.583-69.960	46.0	40.743-51.342
Yucatán	58.8	45.083-72.604	37.7	28.400-46.908	40.9	34.820-46.978
Zacatecas	65.1	58.509-71.639	56.7	48.278-65.154	47.4	42.208-52.668
Nacional	63.0	61.441-64.584	45.5	43.067-47.866	40.2	38.904-41.427

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen
por estado según sexo**

Cuadro ICEI8

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.0	0.805-3.131	1.2	0.461-1.890	1.6	0.854-2.256
Baja California	2.2	0.974-3.459	0.5	0.081-0.947	1.4	0.717-2.031
Baja California Sur	2.3	0.482-4.060	0.8	0.219-1.448	1.6	0.590-2.553
Campeche	3.3	1.549-5.034	0.3	---	1.8	0.930-2.642
Chiapas	0.6	0.155-1.097	1.0	---	0.8	0.193-1.424
Chihuahua	1.9	0.878-2.958	0.4	0.008-0.775	1.1	0.598-1.691
Ciudad de México	3.0	1.258-4.702	1.3	---	2.1	1.011-3.230
Coahuila	2.9	1.495-4.379	0.4	0.008-0.707	1.6	0.889-2.375
Colima	1.3	0.583-2.040	1.7	0.171-3.244	1.5	0.690-2.332
Durango	3.8	2.183-5.391	1.6	0.541-2.605	2.6	1.717-3.568
Estado de México	1.3	0.411-2.138	0.7	0.112-1.213	1.0	0.467-1.446
Guanajuato	2.6	1.119-4.146	0.2	---	1.3	0.594-2.082
Guerrero	1.0	0.156-1.868	0.6	---	0.8	0.270-1.344
Hidalgo	0.9	0.187-1.691	0.5	0.037-0.903	0.7	0.169-1.216
Jalisco	2.0	0.826-3.105	0.5	---	1.2	0.582-1.793
Michoacán	2.0	0.971-3.066	0.5	---	1.2	0.674-1.792
Morelos	1.5	0.179-2.834	0.7	0.102-1.293	1.1	0.392-1.773
Nayarit	1.5	0.643-2.416	1.3	0.356-2.224	1.4	0.676-2.140
Nuevo León	1.4	0.530-2.276	0.4	0.063-0.782	0.9	0.452-1.363
Oaxaca	2.0	0.529-3.387	1.5	0.024-2.974	1.7	0.693-2.736
Puebla	1.8	0.798-2.898	0.4	---	1.1	0.518-1.669
Querétaro	1.4	0.428-2.368	0.4	0.097-0.769	0.9	0.397-1.390
Quintana Roo	2.0	0.546-3.539	0.4	0.057-0.737	1.2	0.446-2.021
San Luis Potosí	1.7	0.237-3.263	0.5	0.019-0.895	1.1	0.328-1.827
Sinaloa	2.5	1.165-3.856	0.1	---	1.3	0.615-1.963
Sonora	1.6	0.176-2.980	0.7	0.044-1.389	1.1	0.379-1.914
Tabasco	1.7	0.760-2.666	0.6	0.013-1.188	1.1	0.607-1.668
Tamaulipas	1.1	0.225-2.042	--	---	0.6	0.106-1.007
Tlaxcala	1.9	0.763-3.091	0.7	0.039-1.314	1.3	0.642-1.902
Veracruz	2.0	0.687-3.259	0.6	---	1.3	0.532-2.022
Yucatán	1.6	0.603-2.632	1.2	0.255-2.062	1.4	0.723-2.039
Zacatecas	2.7	0.888-4.428	1.5	0.509-2.434	2.0	0.789-3.284
Nacional	1.9	1.599-2.136	0.7	0.491-0.843	1.2	1.089-1.404

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen
por estado según edad**

Cuadro ICEI9

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.6	0.962-4.183	2.4	1.007-3.745	0.3	---
Baja California	1.2	0.080-2.309	1.9	0.435-3.341	0.9	0.304-1.587
Baja California Sur	2.5	0.552-4.357	1.8	---	1.0	0.250-1.732
Campeche	3.6	1.538-5.652	1.8	0.250-3.409	1.0	0.022-1.986
Chiapas	1.2	0.205-2.268	1.2	---	0.1	---
Chihuahua	3.0	1.001-4.979	1.5	0.482-2.502	0.1	---
Ciudad de México	4.9	1.607-8.212	2.8	0.316-5.337	0.8	0.016-1.676
Coahuila	2.7	1.056-4.265	2.4	0.757-4.101	0.5	0.017-0.985
Colima	5.6	0.915-10.203	0.9	0.109-1.789	0.6	0.011-1.113
Durango	4.3	1.519-7.011	1.9	0.668-3.102	2.7	1.244-4.074
Estado de México	3.3	1.433-5.119	0.7	---	0.3	---
Guanajuato	3.4	1.514-5.247	1.1	---	0.7	0.035-1.365
Guerrero	2.5	0.531-4.430	0.6	---	0.2	---
Hidalgo	2.9	0.819-5.076	0.2	---	0.2	---
Jalisco	3.5	1.143-5.853	1.1	0.010-2.175	0.4	---
Michoacán	3.8	1.627-5.879	0.7	0.059-1.383	0.6	---
Morelos	3.8	0.084-7.482	0.8	0.072-1.579	0.3	---
Nayarit	5.5	2.241-8.710	0.6	---	0.5	0.032-1.031
Nuevo León	3.2	1.346-5.137	0.5	---	0.5	0.065-0.958
Oaxaca	4.0	0.720-7.198	2.2	0.122-4.262	0.2	---
Puebla	3.0	0.598-5.376	0.4	---	0.9	0.195-1.689
Querétaro	2.8	1.121-4.433	0.7	---	0.3	---
Quintana Roo	3.1	1.273-4.886	1.0	---	0.8	---
San Luis Potosí	1.4	0.191-2.666	1.8	---	0.3	---
Sinaloa	2.8	0.638-5.059	1.8	0.357-3.306	0.2	---
Sonora	2.3	0.300-4.359	1.6	---	0.3	---
Tabasco	2.6	0.915-4.213	1.1	0.079-2.086	0.6	0.065-1.136
Tamaulipas	1.9	0.395-3.402	0.7	---	--	---
Tlaxcala	3.2	0.794-5.599	1.0	0.068-1.971	0.7	---
Veracruz	3.0	0.834-5.230	1.0	---	0.8	0.008-1.671
Yucatán	2.3	0.475-4.030	1.5	0.394-2.611	0.9	0.005-1.875
Zacatecas	3.5	1.730-5.265	2.1	0.061-4.158	1.3	0.419-2.254
Nacional	3.1	2.600-3.569	1.2	0.930-1.536	0.5	0.403-0.687

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen
por estado según edad**

Cuadro ICEI10

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.5	0.339-4.751	3.6	0.925-6.311	--	---
Baja California	2.1	---	3.0	0.239-5.742	1.5	0.340-2.723
Baja California Sur	3.2	0.387-6.112	2.4	---	1.8	0.375-3.191
Campeche	5.6	1.996-9.231	3.6	0.301-6.802	2.1	0.049-4.070
Chiapas	2.0	0.118-3.973	0.2	---	0.3	---
Chihuahua	3.5	0.541-6.540	3.0	0.913-5.071	0.3	---
Ciudad de México	8.4	2.229-14.508	3.0	---	1.3	---
Coahuila	4.4	1.258-7.464	4.3	1.077-7.430	1.1	0.042-2.063
Colima	4.4	1.516-7.213	0.2	---	1.2	---
Durango	4.2	1.374-7.015	2.7	0.672-4.634	4.7	1.849-7.544
Estado de México	3.4	0.853-6.031	1.5	---	0.2	---
Guanajuato	5.8	2.084-9.432	2.3	---	1.5	0.069-2.942
Guerrero	2.4	0.164-4.723	0.9	---	0.3	---
Hidalgo	4.0	0.484-7.560	--	---	0.4	---
Jalisco	5.4	1.495-9.367	2.2	---	0.2	---
Michoacán	4.7	1.619-7.841	1.4	0.028-2.849	1.3	---
Morelos	6.5	---	0.7	---	0.2	---
Nayarit	5.4	2.047-8.685	0.7	---	0.7	---
Nuevo León	4.6	1.245-7.911	1.0	---	0.7	---
Oaxaca	3.8	0.735-6.829	3.0	---	0.2	---
Puebla	4.1	0.532-7.686	0.8	---	1.8	0.209-3.362
Querétaro	3.3	0.869-5.819	1.6	---	0.4	---
Quintana Roo	3.8	1.032-6.489	1.9	---	1.5	---
San Luis Potosí	1.9	---	3.1	---	0.4	---
Sinaloa	5.6	1.324-9.954	3.5	0.495-6.431	0.4	---
Sonora	0.9	---	3.2	---	0.4	---
Tabasco	4.4	1.218-7.536	1.3	---	0.9	---
Tamaulipas	3.8	0.794-6.763	1.3	---	--	---
Tlaxcala	5.3	0.803-9.861	1.5	---	0.8	0.004-1.555
Veracruz	4.9	0.925-8.879	1.0	---	1.6	---
Yucatán	1.9	0.193-3.516	1.8	---	1.4	---
Zacatecas	3.6	1.177-6.073	3.9	---	1.0	0.002-2.063
Nacional	4.2	3.433-5.006	1.9	1.401-2.431	0.8	0.603-1.091

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen
por estado según edad**

Cuadro ICEI11

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.6	0.113-5.087	1.2	0.280-2.146	0.6	---
Baja California	0.3	---	0.8	---	0.4	---
Baja California Sur	1.6	---	1.2	0.150-2.310	0.2	---
Campeche	1.5	---	0.2	---	--	---
Chiapas	0.4	---	2.1	---	--	---
Chihuahua	2.4	0.033-4.823	--	---	--	---
Ciudad de México	1.2	---	2.6	---	0.4	---
Coahuila	0.9	---	0.6	---	--	---
Colima	6.8	---	1.7	0.223-3.086	--	---
Durango	4.3	---	1.2	---	0.8	---
Estado de México	3.1	0.368-5.847	--	---	0.4	---
Guanajuato	1.0	---	--	---	--	---
Guerrero	2.5	---	0.3	---	***	---
Hidalgo	1.9	0.033-3.678	0.4	---	--	---
Jalisco	1.4	---	--	---	0.5	---
Michoacán	2.8	---	0.1	---	--	---
Morelos	1.0	---	1.0	---	0.3	---
Nayarit	5.6	0.595-10.585	0.6	---	0.4	---
Nuevo León	1.9	---	--	---	0.3	---
Oaxaca	4.1	---	1.5	---	0.3	---
Puebla	1.9	---	--	---	0.2	---
Querétaro	2.2	0.322-4.105	--	---	0.2	---
Quintana Roo	2.4	0.231-4.492	0.1	---	--	---
San Luis Potosí	0.9	---	0.5	---	0.2	---
Sinaloa	--	---	0.2	---	--	---
Sonora	3.8	---	--	---	0.2	---
Tabasco	0.7	---	0.9	---	0.3	---
Tamaulipas	--	---	--	---	--	---
Tlaxcala	1.0	---	0.6	---	0.6	---
Veracruz	1.1	---	1.0	---	0.2	---
Yucatán	2.6	---	1.2	---	0.5	---
Zacatecas	3.4	0.569-6.156	0.5	---	1.6	0.240-2.980
Nacional	1.9	1.355-2.491	0.6	0.260-0.929	0.3	0.113-0.434

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma
por estado según sexo**

Cuadro ICEI12

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.0	0.132-1.951	0.3	---	0.7	0.154-1.175
Baja California	0.8	---	0.6	0.093-1.111	0.7	0.177-1.255
Baja California Sur	1.4	---	0.6	0.129-1.139	1.0	0.126-1.932
Campeche	1.6	0.182-2.944	0.4	0.082-0.739	1.0	0.290-1.656
Chiapas	0.5	---	0.2	---	0.3	0.056-0.581
Chihuahua	1.2	0.393-2.030	0.6	---	0.9	0.262-1.582
Ciudad de México	1.1	0.440-1.838	0.4	---	0.7	0.315-1.156
Coahuila	1.4	0.455-2.326	0.5	0.043-0.924	0.9	0.395-1.469
Colima	2.6	1.172-3.987	1.4	0.041-2.812	2.0	1.030-2.969
Durango	2.0	0.669-3.379	0.9	0.036-1.769	1.4	0.624-2.265
Estado de México	0.5	---	0.5	---	0.5	0.070-0.937
Guanajuato	0.7	0.087-1.220	0.4	---	0.5	0.166-0.831
Guerrero	0.9	---	0.4	0.088-0.783	0.7	---
Hidalgo	0.5	---	***	---	0.2	---
Jalisco	4.2	---	1.0	---	2.6	---
Michoacán	1.3	0.323-2.232	--	---	0.6	0.152-1.066
Morelos	0.8	0.163-1.459	0.3	---	0.5	0.182-0.858
Nayarit	0.9	0.082-1.758	0.9	0.011-1.758	0.9	0.299-1.505
Nuevo León	0.6	---	0.2	---	0.4	0.077-0.688
Oaxaca	0.5	0.001-0.947	2.1	0.520-3.725	1.3	0.483-2.215
Puebla	0.8	0.058-1.486	0.2	---	0.4	0.104-0.791
Querétaro	0.3	---	0.4	---	0.4	0.002-0.719
Quintana Roo	1.1	0.181-1.958	0.7	0.234-1.196	0.9	0.398-1.393
San Luis Potosí	1.0	---	0.2	---	0.6	0.010-1.161
Sinaloa	1.3	0.312-2.198	0.4	---	0.8	0.309-1.288
Sonora	0.4	0.024-0.751	0.3	---	0.3	0.043-0.619
Tabasco	1.3	0.381-2.155	1.0	0.248-1.716	1.1	0.566-1.674
Tamaulipas	1.1	0.195-1.948	0.7	0.186-1.274	0.9	0.332-1.464
Tlaxcala	1.1	0.361-1.882	0.4	---	0.7	0.295-1.203
Veracruz	1.5	0.366-2.535	0.8	0.179-1.370	1.1	0.444-1.754
Yucatán	0.9	0.187-1.532	0.4	---	0.6	0.207-1.036
Zacatecas	1.1	0.222-1.944	0.8	0.127-1.536	1.0	0.370-1.532
Nacional	1.1	0.636-1.614	0.5	0.372-0.687	0.8	0.566-1.068

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma
por estado según edad**

Cuadro ICEI13

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	0.7	---	1.0	---	0.3	0.009-0.587
Baja California	1.2	---	1.1	---	0.2	---
Baja California Sur	1.4	0.156-2.561	1.6	---	0.3	---
Campeche	0.7	---	0.9	---	1.1	0.129-2.085
Chiapas	0.6	---	0.2	---	0.2	---
Chihuahua	0.2	---	0.9	0.068-1.760	1.2	---
Ciudad de México	0.9	---	1.3	0.285-2.231	0.3	0.001-0.574
Coahuila	1.5	---	1.1	0.101-2.089	0.6	0.050-1.088
Colima	1.3	0.128-2.396	2.9	0.865-4.871	1.5	0.201-2.729
Durango	2.3	---	0.9	0.082-1.710	1.6	0.221-2.952
Estado de México	0.6	---	0.8	---	0.2	---
Guanajuato	1.3	0.009-2.499	0.2	---	0.4	---
Guerrero	0.6	---	1.0	---	0.3	0.006-0.691
Hidalgo	1.1	---	0.1	---	***	---
Jalisco	3.2	---	0.7	0.010-1.373	4.1	---
Michoacán	0.8	0.023-1.664	1.0	---	0.1	---
Morelos	0.5	---	0.6	---	0.5	---
Nayarit	0.9	0.013-1.693	0.8	---	1.0	---
Nuevo León	1.5	---	0.2	---	0.2	---
Oaxaca	2.8	---	1.9	0.156-3.593	0.2	---
Puebla	0.2	---	0.6	---	0.4	---
Querétaro	0.3	---	0.5	---	0.2	---
Quintana Roo	***	---	1.2	0.227-2.179	0.9	0.237-1.512
San Luis Potosí	0.3	---	1.1	---	0.3	---
Sinaloa	0.4	---	1.3	0.164-2.363	0.5	0.014-1.071
Sonora	1.1	---	0.1	---	0.3	---
Tabasco	1.2	0.189-2.203	0.7	0.178-1.226	1.5	0.325-2.695
Tamaulipas	1.7	0.217-3.212	1.4	0.284-2.542	0.1	---
Tlaxcala	1.2	0.117-2.223	0.9	0.116-1.649	0.4	---
Veracruz	1.5	0.093-2.822	1.1	---	1.0	0.130-1.868
Yucatán	0.6	---	0.8	---	0.4	---
Zacatecas	1.5	0.522-2.457	1.0	0.006-1.962	0.7	0.018-1.357
Nacional	1.1	0.710-1.494	0.8	0.630-1.066	0.7	0.157-1.199

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población masculina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma
por estado según edad**

Cuadro ICEI14

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.4	---	1.6	---	0.3	---
Baja California	0.8	---	1.4	---	0.3	---
Baja California Sur	0.7	---	2.4	---	0.6	---
Campeche	1.2	---	1.7	---	1.6	---
Chiapas	0.9	---	0.5	---	0.3	---
Chihuahua	0.5	---	1.8	0.106-3.562	0.9	---
Ciudad de México	1.2	---	1.9	0.373-3.443	0.5	---
Coahuila	2.4	---	1.4	---	0.9	---
Colima	2.5	0.230-4.673	3.8	0.668-6.837	1.5	0.097-2.941
Durango	2.0	---	1.4	0.089-2.635	2.7	---
Estado de México	--	---	0.8	---	0.4	---
Guanajuato	2.2	---	--	---	0.6	---
Guerrero	0.8	---	1.9	---	--	---
Hidalgo	2.3	---	0.1	---	--	---
Jalisco	1.3	---	1.1	---	8.6	---
Michoacán	1.7	0.054-3.300	2.1	---	0.3	---
Morelos	1.0	---	1.1	---	0.5	---
Nayarit	1.4	---	1.4	---	0.3	---
Nuevo León	2.1	---	0.4	---	0.1	---
Oaxaca	1.1	---	0.7	---	--	---
Puebla	0.5	---	1.1	---	0.6	---
Querétaro	0.5	---	0.4	---	0.2	---
Quintana Roo	***	---	1.5	---	0.9	---
San Luis Potosí	0.3	---	2.1	---	0.3	---
Sinaloa	0.3	---	2.4	0.195-4.681	0.6	---
Sonora	1.1	---	--	---	0.5	---
Tabasco	1.7	---	0.7	---	1.7	---
Tamaulipas	1.2	---	2.2	0.185-4.166	--	---
Tlaxcala	1.1	---	1.3	---	0.9	---
Veracruz	1.4	---	0.9	---	1.9	0.083-3.735
Yucatán	1.2	---	0.7	---	0.8	---
Zacatecas	1.4	0.254-2.485	1.5	---	0.5	---
Nacional	1.1	0.751-1.400	1.2	0.791-1.525	1.1	0.025-2.204

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población femenina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma
por estado según edad**

Cuadro ICEI15

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	--	---	0.5	---	0.3	---
Baja California	1.7	---	0.8	---	0.1	---
Baja California Sur	2.0	---	0.8	---	--	---
Campeche	0.3	---	0.2	---	0.7	0.019-1.290
Chiapas	0.3	---	0.1	---	0.2	---
Chihuahua	--	---	--	---	1.4	---
Ciudad de México	0.6	---	0.6	---	0.1	---
Coahuila	0.5	---	0.7	---	0.3	---
Colima	--	---	2.0	---	1.4	---
Durango	2.7	---	0.5	---	0.6	---
Estado de México	1.1	---	0.8	---	--	---
Guanajuato	0.3	---	0.4	---	0.3	---
Guerrero	0.5	---	0.2	---	0.7	0.010-1.297
Hidalgo	--	---	--	---	0.1	---
Jalisco	5.1	---	0.3	---	0.1	---
Michoacán	--	---	--	---	--	---
Morelos	--	---	0.2	---	0.4	---
Nayarit	0.3	---	0.3	---	1.6	---
Nuevo León	0.8	---	--	---	0.2	---
Oaxaca	4.4	---	2.8	---	0.4	---
Puebla	--	---	0.2	---	0.2	---
Querétaro	--	---	0.7	---	0.3	---
Quintana Roo	***	---	0.8	0.007-1.692	0.8	0.003-1.637
San Luis Potosí	0.3	---	0.2	---	0.3	---
Sinaloa	0.5	---	0.1	---	0.5	---
Sonora	1.1	---	0.1	---	0.1	---
Tabasco	0.7	---	0.7	---	1.4	---
Tamaulipas	2.2	---	0.7	---	0.3	---
Tlaxcala	1.2	---	0.5	---	--	---
Veracruz	1.6	---	1.2	0.017-2.290	0.2	---
Yucatán	--	---	0.9	---	0.1	---
Zacatecas	1.6	---	0.5	---	0.8	---
Nacional	1.1	0.402-1.856	0.6	0.312-0.806	0.3	0.194-0.376

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas
por estado según sexo**

Cuadro ICEI16

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	8.2	5.314-11.034	1.5	0.723-2.270	4.7	3.194-6.193
Baja California	4.4	2.440-6.361	1.0	0.203-1.744	2.7	1.621-3.787
Baja California Sur	3.2	1.589-4.855	2.0	0.914-3.119	2.6	1.663-3.608
Campeche	5.5	3.285-7.626	1.1	0.461-1.686	3.2	2.051-4.374
Chiapas	3.7	1.550-5.803	0.5	0.100-0.911	2.0	0.946-3.105
Chihuahua	4.6	3.112-6.151	1.3	0.549-2.024	2.9	2.060-3.813
Ciudad de México	7.1	4.622-9.656	2.0	0.781-3.261	4.5	3.112-5.821
Coahuila	7.6	5.067-10.036	2.6	1.087-4.113	5.0	3.581-6.514
Colima	7.9	5.438-10.345	2.9	1.425-4.405	5.4	3.969-6.805
Durango	5.9	3.770-8.019	1.1	0.449-1.762	3.4	2.345-4.493
Estado de México	6.6	4.338-8.790	1.5	0.707-2.222	3.9	2.752-5.082
Guanajuato	7.1	5.066-9.181	2.9	1.103-4.629	4.9	3.405-6.354
Guerrero	6.3	3.823-8.853	1.1	0.419-1.754	3.6	2.347-4.845
Hidalgo	7.4	4.543-10.257	1.2	0.484-1.888	4.1	2.743-5.525
Jalisco	10.8	4.045-17.494	2.4	0.648-4.196	6.5	2.920-10.040
Michoacán	8.3	6.055-10.622	2.1	0.986-3.198	5.1	3.865-6.277
Morelos	6.9	4.015-9.697	0.9	0.297-1.490	3.7	2.352-5.105
Nayarit	7.2	4.881-9.600	2.7	1.399-3.949	4.9	3.568-6.284
Nuevo León	8.2	5.372-11.010	2.1	0.924-3.321	5.1	3.494-6.749
Oaxaca	5.8	3.060-8.597	2.4	0.762-4.124	4.0	2.296-5.768
Puebla	4.3	2.435-6.157	1.8	0.801-2.761	3.0	1.886-4.031
Querétaro	7.1	4.681-9.461	1.4	0.480-2.283	4.1	2.845-5.345
Quintana Roo	6.4	3.884-8.845	2.0	1.085-3.009	4.2	2.856-5.627
San Luis Potosí	6.5	3.599-9.352	1.7	0.804-2.526	4.0	2.494-5.452
Sinaloa	4.5	2.447-6.462	0.9	0.253-1.472	2.6	1.601-3.680
Sonora	3.6	1.697-5.428	1.5	0.606-2.443	2.5	1.400-3.683
Tabasco	7.5	3.482-11.568	1.0	0.314-1.618	4.1	2.104-6.164
Tamaulipas	3.9	2.330-5.522	2.1	1.181-3.082	3.0	2.042-3.984
Tlaxcala	5.0	3.347-6.699	0.9	0.307-1.434	2.8	1.954-3.741
Veracruz	5.0	2.776-7.299	1.2	0.427-2.064	3.1	1.821-4.309
Yucatán	4.9	2.844-7.004	0.8	0.310-1.234	2.8	1.736-3.845
Zacatecas	7.1	4.356-9.800	1.9	0.884-3.015	4.4	2.951-5.833
Nacional	6.4	5.704-7.085	1.7	1.431-1.929	4.0	3.588-4.325

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas
por estado según edad**

Cuadro ICEI17

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	9.1	5.016-13.247	5.8	2.977-8.614	1.7	0.513-2.846
Baja California	4.6	1.582-7.622	3.6	1.587-5.646	1.1	0.351-1.910
Baja California Sur	5.7	2.675-8.707	2.6	0.763-4.422	1.6	0.683-2.525
Campeche	5.8	3.425-8.199	2.8	1.257-4.345	2.6	0.549-4.565
Chiapas	1.7	0.468-3.013	2.3	0.107-4.476	1.9	0.688-3.082
Chihuahua	4.5	2.083-6.976	3.2	1.769-4.620	2.1	1.001-3.223
Ciudad de México	3.8	1.647-5.905	6.4	3.277-9.439	3.2	1.742-4.588
Coahuila	5.8	2.762-8.787	7.6	4.587-10.669	2.4	1.292-3.480
Colima	8.2	4.676-11.704	7.1	4.390-9.852	2.8	1.462-4.080
Durango	4.6	2.562-6.551	3.0	1.501-4.478	3.3	1.718-4.953
Estado de México	6.1	3.594-8.587	4.6	2.200-6.916	2.5	1.272-3.797
Guanajuato	6.4	3.944-8.816	5.8	3.111-8.407	3.3	1.722-4.960
Guerrero	4.9	2.610-7.238	4.5	1.822-7.185	2.1	0.943-3.176
Hidalgo	7.8	3.587-12.106	5.2	2.938-7.410	1.7	0.718-2.696
Jalisco	8.8	3.859-13.677	6.4	3.170-9.553	5.7	---
Michoacán	8.7	5.074-12.318	4.8	2.956-6.628	3.7	2.161-5.333
Morelos	7.3	3.079-11.462	4.4	1.437-7.398	1.8	0.852-2.760
Nayarit	8.8	5.084-12.610	4.4	2.415-6.397	3.9	2.221-5.549
Nuevo León	7.9	4.878-11.006	6.5	2.887-10.069	3.1	1.402-4.699
Oaxaca	8.2	3.599-12.757	4.6	1.590-7.588	1.6	0.591-2.623
Puebla	4.9	2.011-7.790	3.9	1.802-6.009	1.1	0.388-1.894
Querétaro	5.5	3.039-8.042	4.5	2.134-6.767	3.1	1.445-4.838
Quintana Roo	4.7	1.661-7.651	5.6	3.177-8.105	2.4	0.833-4.028
San Luis Potosí	3.3	1.697-4.850	5.2	2.421-8.063	3.1	0.949-5.287
Sinaloa	2.8	1.354-4.241	4.2	2.025-6.293	1.2	0.349-2.106
Sonora	4.5	1.885-7.114	3.4	1.192-5.628	1.1	0.277-1.851
Tabasco	4.3	2.254-6.259	5.0	0.507-9.473	3.2	1.611-4.831
Tamaulipas	7.0	3.785-10.237	3.5	1.804-5.269	1.1	0.237-2.037
Tlaxcala	4.8	2.480-7.072	2.9	1.391-4.331	2.0	0.943-3.087
Veracruz	4.2	1.663-6.773	2.4	0.949-3.788	3.2	1.203-5.219
Yucatán	2.9	1.118-4.643	3.3	1.264-5.302	2.3	1.127-3.459
Zacatecas	7.5	4.264-10.831	3.1	1.261-4.868	4.3	1.819-6.737
Nacional	5.7	5.023-6.367	4.6	4.024-5.198	2.7	2.082-3.272

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas
por estado según edad**

Cuadro ICEI18

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	14.3	6.761-21.784	10.7	5.281-16.152	2.7	0.440-5.028
Baja California	5.1	0.840-9.436	6.7	2.817-10.677	1.9	0.433-3.301
Baja California Sur	4.1	1.680-6.528	3.3	0.002-6.594	2.8	1.171-4.508
Campeche	8.7	4.629-12.817	4.8	1.736-7.924	4.7	0.762-8.612
Chiapas	2.1	---	4.6	0.073-9.162	3.6	1.229-5.945
Chihuahua	4.5	1.408-7.547	6.0	3.215-8.694	3.5	1.347-5.613
Ciudad de México	3.8	0.586-6.957	10.6	4.809-16.471	5.2	2.814-7.537
Coahuila	7.7	2.675-12.698	11.6	6.353-16.820	3.5	1.437-5.640
Colima	10.5	4.609-16.426	11.4	6.510-16.349	3.5	1.448-5.627
Durango	6.7	3.214-10.087	5.4	2.506-8.347	6.0	2.688-9.314
Estado de México	8.9	4.806-13.064	8.0	3.414-12.522	4.3	1.669-6.942
Guanajuato	8.3	4.476-12.202	7.9	3.825-12.067	5.7	2.741-8.704
Guerrero	7.6	3.498-11.721	9.1	3.585-14.595	3.0	0.833-5.125
Hidalgo	13.3	5.421-21.122	9.6	5.044-14.240	2.9	0.864-4.917
Jalisco	10.9	5.586-16.303	10.5	4.924-16.155	10.9	---
Michoacán	11.7	6.089-17.297	8.3	4.686-11.957	6.8	3.535-10.042
Morelos	12.4	4.627-20.238	8.2	2.180-14.143	3.4	1.451-5.436
Nayarit	10.8	5.114-16.565	8.2	4.366-12.018	4.9	1.924-7.902
Nuevo León	13.3	7.469-19.153	10.8	4.653-16.887	4.2	1.656-6.667
Oaxaca	9.5	2.861-16.143	7.2	1.391-12.995	2.9	0.860-4.916
Puebla	3.8	0.537-7.110	6.8	2.708-10.902	2.0	0.400-3.585
Querétaro	8.4	4.277-12.581	7.8	3.163-12.390	5.8	2.507-9.004
Quintana Roo	6.6	1.087-12.168	8.6	3.952-13.315	3.6	0.729-6.497
San Luis Potosí	3.7	1.420-6.033	9.0	3.540-14.399	5.5	1.041-9.889
Sinaloa	5.1	2.318-7.857	7.6	3.444-11.693	1.4	---
Sonora	5.4	1.334-9.508	5.3	1.096-9.465	1.3	0.118-2.467
Tabasco	6.7	3.022-10.319	9.5	0.615-18.419	5.9	2.704-9.066
Tamaulipas	8.0	3.386-12.673	5.0	1.951-8.107	1.4	0.015-2.821
Tlaxcala	6.0	2.099-9.855	5.4	2.383-8.471	4.2	1.915-6.426
Veracruz	5.9	1.646-10.079	3.5	0.960-6.012	6.0	1.894-10.131
Yucatán	4.5	1.056-7.986	6.6	2.624-10.536	3.5	1.250-5.770
Zacatecas	10.8	5.688-15.840	5.2	1.473-9.014	7.0	2.356-11.702
Nacional	7.6	6.590-8.602	7.8	6.726-8.935	4.5	3.338-5.754

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas
por estado según edad**

Cuadro ICEI19

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	4.0	1.062-7.009	1.2	0.197-2.178	0.8	---
Baja California	4.0	---	0.4	---	0.4	---
Baja California Sur	7.3	1.543-13.133	1.8	0.378-3.317	0.3	---
Campeche	2.9	0.523-5.192	0.9	---	0.5	---
Chiapas	1.4	0.039-2.807	0.3	---	0.3	---
Chihuahua	4.6	1.133-8.032	0.4	---	0.8	---
Ciudad de México	3.8	0.805-6.756	2.2	0.126-4.293	1.5	---
Coahuila	3.8	1.128-6.373	3.6	0.414-6.737	1.3	0.431-2.250
Colima	5.7	1.880-9.562	2.8	0.114-5.517	2.0	0.354-3.730
Durango	2.4	0.798-4.060	0.7	---	1.0	0.019-1.900
Estado de México	3.2	0.565-5.822	1.4	---	1.0	0.180-1.753
Guanajuato	4.4	1.333-7.530	3.8	0.596-7.055	1.3	0.066-2.476
Guerrero	2.2	---	0.3	---	1.3	0.195-2.315
Hidalgo	2.3	0.181-4.483	1.3	---	0.7	0.052-1.253
Jalisco	6.5	---	2.3	0.011-4.685	1.0	0.211-1.866
Michoacán	5.7	1.079-10.241	1.7	0.364-2.982	1.0	---
Morelos	2.0	---	1.0	---	0.4	---
Nayarit	6.8	1.496-12.049	0.7	---	2.9	1.208-4.598
Nuevo León	2.4	0.421-4.438	2.1	0.119-4.165	2.0	0.076-3.950
Oaxaca	6.9	0.233-13.467	2.5	---	0.4	---
Puebla	5.9	1.332-10.563	1.4	0.169-2.561	0.4	---
Querétaro	2.7	0.577-4.762	1.4	---	0.8	---
Quintana Roo	2.6	0.394-4.759	2.6	0.971-4.196	1.2	---
San Luis Potosí	2.8	0.494-5.137	1.9	0.267-3.474	1.0	---
Sinaloa	0.5	---	0.8	---	1.0	0.051-2.045
Sonora	3.6	0.113-7.001	1.5	0.012-2.955	0.8	---
Tabasco	1.8	0.047-3.568	0.8	---	0.8	---
Tamaulipas	6.0	2.199-9.767	2.1	0.616-3.544	0.9	---
Tlaxcala	3.5	0.873-6.226	0.6	---	0.1	---
Veracruz	2.5	---	1.3	---	0.7	0.040-1.390
Yucatán	1.2	---	0.2	---	1.2	0.256-2.067
Zacatecas	4.1	1.319-6.939	1.2	0.164-2.230	1.8	0.163-3.451
Nacional	3.8	2.838-4.665	1.6	1.195-2.009	1.0	0.736-1.253

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 11: CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

Listado de Tablas

Percepción del riesgo de consumir marihuana en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Percepción del riesgo de consumir heroína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años según sexo

Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 18 a 65 años según sexo

Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo

Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Percepción del riesgo de consumir marihuana
en la población de 12 a 65 años según sexo y edad**

Cuadro CN1

Sexo/Edad	N por grupo	Encuesta Nacional 2016	
		N	Es muy peligroso %
Hombres			
12-17	7 247 914	3 282 883	45.3
18-34	16 437 032	4 531 635	27.6
35-65	17 483 670	5 763 042	33.0
Subtotal	41 168 617	13 577 559	33.0
Mujeres			
12-17	7 087 165	3 709 022	52.3
18-34	17 588 359	6 541 642	37.2
35-65	19 417 917	8 325 771	42.9
Subtotal	44 093 441	18 576 435	42.1
Total	85 262 058	32 153 994	37.7

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Percepción del riesgo de consumir heroína
en la población de 12 a 65 años según sexo y edad**

Cuadro CN2

Sexo/Edad	N por grupo	Encuesta Nacional 2016	
		N	Es muy peligroso %
Hombres			
12-17	7 247 914	4 762 858	65.7
18-34	16 437 032	10 802 322	65.7
35-65	17 483 670	11 952 669	68.4
Subtotal	41 168 617	27 517 849	66.8
Mujeres			
12-17	7 087 165	4 895 814	69.1
18-34	17 588 359	12 121 463	68.9
35-65	19 417 917	13 876 284	71.5
Subtotal	44 093 441	30 893 561	70.1
Total	85 262 058	58 411 410	68.5

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Percepción del riesgo de consumir cocaína
en la población de 12 a 65 años según sexo y edad**

Cuadro CN3

Sexo/Edad	N por grupo	Encuesta Nacional 2016	
		N	Es muy peligroso %
Hombres			
12-17	7 247 914	4 795 548	66.2
18-34	16 437 032	10 907 240	66.4
35-65	17 483 670	12 446 998	71.2
Subtotal	41 168 617	28 149 786	68.4
Mujeres			
12-17	7 087 165	4 941 146	69.7
18-34	17 588 359	12 617 413	71.7
35-65	19 417 917	14 315 221	73.7
Subtotal	44 093 441	31 873 779	72.3
Total	85 262 058	60 023 565	70.4

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Percepción del riesgo de consumir inhalables
en la población de 12 a 65 años según sexo y edad**

Cuadro CN4

Sexo/Edad	N por grupo	Encuesta Nacional 2016	
		N	Es muy peligroso %
Hombres			
12-17	7 247 914	4 694 160	64.8
18-34	16 437 032	11 034 567	67.1
35-65	17 483 670	12 537 311	71.7
Subtotal	41 168 617	28 266 038	68.7
Mujeres			
12-17	7 087 165	4 853 970	68.5
18-34	17 588 359	12 439 920	70.7
35-65	19 417 917	14 370 087	74.0
Subtotal	44 093 441	31 663 978	71.8
Total	85 262 058	59 930 016	70.3

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol
en la población de 12 a 65 años según sexo y edad**

Cuadro CN5

Sexo/Edad	N por grupo	Encuesta Nacional 2016	
		N	Es muy peligroso %
Hombres			
12-17	7 247 914	3 092 245	42.7
18-34	16 437 032	6 535 243	39.8
35-65	17 483 670	7 512 538	43.0
Subtotal	41 168 617	17 140 026	41.6
Mujeres			
12-17	7 087 165	3 435 609	48.5
18-34	17 588 359	8 210 128	46.7
35-65	19 417 917	9 816 123	50.6
Subtotal	44 093 441	21 461 860	48.7
Total	85 262 058	38 601 886	45.3

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Tolerancia social ante el consumo de drogas
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CN6

N por subgrupo	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
	7 247 914		7 087 165		14 335 079	
Lo vería mal:						
Tu familia	7 079 375	99.2	6 974 765	99.4	14 054 140	99.3
Tu mejor amigo/a	6 268 442	87.8	6 297 652	89.7	12 566 094	88.8

Porcentajes obtenidos para cada indicador según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Tolerancia social ante el consumo de drogas
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CN7

N por subgrupo	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Lo vería mal:						
Tu familia	33 181 508	98.2	36 579 345	99.1	69 760 853	98.6
Tu mejor amigo/a	29 352 856	87.6	34 451 731	94.7	63 804 587	91.3

Porcentajes obtenidos para cada indicador según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Tolerancia social ante el consumo de alcohol
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CN8

N por subgrupo	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Lo vería/n mal:						
Tu familia	6 860 427	95.2	6 787 276	96.0	13 647 703	95.6
Tu mejor amigo/a	5 121 988	71.5	5 183 234	73.8	10 305 223	72.6

Porcentajes obtenidos para cada indicador según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Tolerancia social ante el consumo de alcohol
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CN9

N por subgrupo	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Lo vería mal:						
Tu familia	28 708 617	85.0	33 053 272	89.6	61 761 889	87.4
Tu mejor amigo/a	19 508 828	58.3	27 188 366	75.0	46 697 194	67.0

Porcentajes obtenidos para cada indicador según sexo.



ANEXO 12: CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

Listado de Tablas

Percepción del riesgo de consumir marihuana en la población de 12 a 65 años según sexo

Percepción del riesgo de consumir marihuana en la población de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir marihuana en la población masculina de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir marihuana en la población femenina de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir heroína en la población de 12 a 65 años según sexo

Percepción del riesgo de consumir heroína en la población de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir heroína en la población masculina de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir heroína en la población femenina de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población de 12 a 65 años según sexo

Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población masculina de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población femenina de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población de 12 a 65 años según sexo

Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población masculina de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población femenina de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo

Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población masculina de 12 a 65 años según edad

Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población femenina de 12 a 65 años según edad

Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años según sexo

Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años según sexo

Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de drogas en la población de 18 a 65 años según sexo

Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de drogas en la población de 18 a 65 años según sexo

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo

Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo

Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir marihuana
en la población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE1

Estado	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	30.2	44.7	37.7
Baja California	29.9	35.5	32.7
Baja California Sur	32.4	39.9	36.1
Campeche	38.6	45.2	42.0
Chiapas	45.8	52.2	49.1
Chihuahua	36.3	43.6	40.0
Ciudad de México	21.8	30.3	26.2
Coahuila	35.6	45.3	40.5
Colima	24.8	36.8	30.8
Durango	34.2	44.5	39.5
Estado de México	34.5	38.3	36.5
Guanajuato	37.7	48.6	43.5
Guerrero	36.6	49.8	43.5
Hidalgo	31.5	48.2	40.2
Jalisco	28.3	33.4	30.9
Michoacán	29.7	49.1	39.8
Morelos	37.4	47.3	42.6
Nayarit	26.9	35.9	31.5
Nuevo León	29.3	40.5	35.0
Oaxaca	39.7	47.8	44.0
Puebla	30.1	42.9	36.9
Querétaro	34.1	44.9	39.8
Quintana Roo	36.4	42.2	39.3
San Luis Potosí	32.0	47.3	40.0
Sinaloa	26.4	35.3	30.9
Sonora	28.4	39.4	33.9
Tabasco	38.6	50.2	44.6
Tamaulipas	29.8	41.6	35.8
Tlaxcala	36.8	47.3	42.3
Veracruz	39.4	46.4	43.1
Yucatán	33.7	43.2	38.6
Zacatecas	38.6	49.5	44.3
Nacional	33.0	42.1	37.7

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir marihuana
en la población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE2

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	49.3	27.7	42.7
Baja California	40.9	27.6	34.5
Baja California Sur	47.4	31.5	36.6
Campeche	56.0	33.7	44.3
Chiapas	60.6	49.4	42.6
Chihuahua	53.6	33.0	41.1
Ciudad de México	35.0	18.8	29.8
Coahuila	48.3	33.3	44.2
Colima	45.3	25.2	30.8
Durango	46.0	33.7	42.2
Estado de México	41.6	31.1	39.6
Guanajuato	52.6	38.9	44.0
Guerrero	56.3	37.7	42.5
Hidalgo	48.7	37.3	39.5
Jalisco	45.4	27.3	28.7
Michoacán	45.7	36.6	40.4
Morelos	46.2	41.1	42.6
Nayarit	45.5	27.8	29.4
Nuevo León	47.2	26.1	38.7
Oaxaca	51.3	39.4	44.6
Puebla	50.3	31.2	36.5
Querétaro	52.9	32.9	41.1
Quintana Roo	54.1	34.6	38.9
San Luis Potosí	54.0	34.4	39.0
Sinaloa	50.2	25.8	28.2
Sonora	44.7	30.6	33.0
Tabasco	62.0	39.1	42.9
Tamaulipas	46.9	31.0	36.2
Tlaxcala	53.7	38.5	41.2
Veracruz	57.1	36.8	43.0
Yucatán	51.2	36.0	36.3
Zacatecas	52.0	39.6	45.3
Nacional	48.8	32.5	38.2

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir marihuana
en la población masculina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE3

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	48.4	18.5	33.8
Baja California	31.4	24.0	35.0
Baja California Sur	43.0	29.2	31.9
Campeche	57.7	22.8	45.9
Chiapas	60.3	44.8	38.7
Chihuahua	53.5	29.6	35.6
Ciudad de México	27.1	16.4	24.8
Coahuila	43.9	26.4	41.3
Colima	47.4	19.3	21.3
Durango	40.7	28.4	36.9
Estado de México	40.5	30.5	36.1
Guanajuato	42.7	36.6	36.4
Guerrero	50.7	29.3	36.0
Hidalgo	44.3	25.7	31.0
Jalisco	47.3	26.2	22.3
Michoacán	39.6	25.1	29.5
Morelos	43.4	35.7	36.5
Nayarit	48.7	20.1	24.3
Nuevo León	41.3	21.1	32.6
Oaxaca	52.2	29.8	41.8
Puebla	44.0	22.5	31.0
Querétaro	51.8	25.6	35.0
Quintana Roo	48.8	33.8	34.5
San Luis Potosí	48.0	26.4	29.8
Sinaloa	48.0	21.0	22.8
Sonora	42.5	22.5	28.6
Tabasco	62.7	31.7	35.0
Tamaulipas	48.5	27.9	24.8
Tlaxcala	50.0	32.3	35.2
Veracruz	50.8	32.5	40.7
Yucatán	47.5	25.9	35.9
Zacatecas	49.2	30.1	41.4
Nacional	45.3	27.6	33.0

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

Percepción del riesgo de consumir marihuana
en la población femenina de 12 a 65 años según edad

Cuadro CNE4

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	50.2	36.3	50.4
Baja California	50.7	31.3	34.1
Baja California Sur	51.9	34.0	41.6
Campeche	54.3	43.9	42.9
Chiapas	61.0	53.5	46.2
Chihuahua	53.6	36.4	46.1
Ciudad de México	43.6	21.1	34.0
Coahuila	52.9	40.4	46.8
Colima	43.1	31.1	39.8
Durango	51.4	38.7	46.9
Estado de México	42.7	31.7	42.7
Guanajuato	62.4	40.9	50.5
Guerrero	62.0	45.4	48.2
Hidalgo	53.1	47.3	47.1
Jalisco	43.4	28.3	34.5
Michoacán	51.8	46.8	50.1
Morelos	48.9	46.0	48.0
Nayarit	42.3	35.1	34.3
Nuevo León	53.3	31.2	44.4
Oaxaca	50.5	47.1	47.2
Puebla	56.3	38.8	41.2
Querétaro	54.1	39.6	46.6
Quintana Roo	59.7	35.5	43.4
San Luis Potosí	60.1	41.7	47.2
Sinaloa	52.4	30.5	33.3
Sonora	46.9	38.9	37.3
Tabasco	61.3	45.9	50.2
Tamaulipas	45.2	34.1	47.0
Tlaxcala	57.5	44.1	46.5
Veracruz	63.6	40.6	45.2
Yucatán	54.9	45.5	36.8
Zacatecas	55.1	47.8	48.8
Nacional	52.3	37.2	42.9

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir heroína
en la población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE5

Estado	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	66.6	74.1	70.5
Baja California	74.1	78.2	76.1
Baja California Sur	73.3	77.0	75.1
Campeche	66.6	63.7	65.2
Chiapas	62.3	68.9	65.8
Chihuahua	72.1	75.2	73.7
Ciudad de México	67.6	71.2	69.5
Coahuila	65.2	70.2	67.8
Colima	73.1	73.5	73.3
Durango	70.4	74.2	72.3
Estado de México	65.9	66.8	66.4
Guanajuato	77.2	78.5	77.9
Guerrero	65.7	69.6	67.7
Hidalgo	59.7	67.4	63.7
Jalisco	74.6	70.5	72.5
Michoacán	66.2	75.9	71.3
Morelos	69.0	75.1	72.2
Nayarit	77.5	75.1	76.3
Nuevo León	62.5	65.0	63.8
Oaxaca	63.7	66.8	65.3
Puebla	57.7	63.6	60.9
Querétaro	68.3	72.7	70.6
Quintana Roo	67.2	66.4	66.8
San Luis Potosí	57.6	64.9	61.4
Sinaloa	75.5	80.4	78.0
Sonora	69.7	73.8	71.8
Tabasco	64.2	70.5	67.5
Tamaulipas	58.7	64.3	61.6
Tlaxcala	64.2	68.4	66.4
Veracruz	65.3	67.7	66.6
Yucatán	61.7	64.5	63.2
Zacatecas	66.0	74.8	70.6
Nacional	66.8	70.1	68.5

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir heroína
en la población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE6

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	69.5	64.2	77.2
Baja California	68.1	76.0	79.1
Baja California Sur	66.7	73.6	79.6
Campeche	69.6	63.0	65.4
Chiapas	69.9	68.1	61.0
Chihuahua	74.2	72.7	74.5
Ciudad de México	65.4	66.8	72.7
Coahuila	67.1	63.5	71.9
Colima	67.4	71.0	77.6
Durango	67.0	71.4	75.5
Estado de México	64.2	65.4	68.0
Guanajuato	75.0	77.4	79.7
Guerrero	72.3	65.1	67.9
Hidalgo	61.8	62.4	65.8
Jalisco	69.4	72.1	74.1
Michoacán	70.7	71.0	71.9
Morelos	67.5	70.7	75.2
Nayarit	75.3	77.8	75.3
Nuevo León	65.4	58.9	67.4
Oaxaca	66.5	64.2	65.8
Puebla	62.4	60.5	60.6
Querétaro	72.1	71.1	69.5
Quintana Roo	65.2	66.2	68.1
San Luis Potosí	66.7	59.8	60.6
Sinaloa	75.0	77.3	79.7
Sonora	65.0	71.9	74.1
Tabasco	69.4	66.0	68.1
Tamaulipas	59.3	58.6	65.0
Tlaxcala	69.0	62.5	69.3
Veracruz	65.8	66.2	67.1
Yucatán	60.3	64.1	63.3
Zacatecas	66.3	71.7	71.4
Nacional	67.4	67.4	70.0

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir heroína
en la población masculina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE7

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	73.8	54.5	75.6
Baja California	59.6	73.3	80.2
Baja California Sur	64.4	72.3	77.3
Campeche	71.9	62.5	68.5
Chiapas	65.1	65.8	57.0
Chihuahua	74.6	72.3	71.0
Ciudad de México	55.8	66.8	71.8
Coahuila	62.6	57.0	74.4
Colima	65.6	69.6	79.3
Durango	63.0	68.4	75.7
Estado de México	64.9	66.9	65.4
Guanajuato	75.1	78.7	76.8
Guerrero	70.3	60.0	68.8
Hidalgo	55.5	59.2	62.0
Jalisco	72.5	74.0	76.0
Michoacán	70.0	63.4	67.2
Morelos	63.9	66.7	73.0
Nayarit	77.0	75.8	79.2
Nuevo León	61.4	59.6	65.5
Oaxaca	66.6	59.9	65.6
Puebla	60.7	57.1	56.9
Querétaro	75.5	67.3	66.2
Quintana Roo	64.0	68.6	66.8
San Luis Potosí	66.1	57.7	53.6
Sinaloa	75.3	72.9	77.8
Sonora	63.3	68.8	72.9
Tabasco	70.7	61.9	63.8
Tamaulipas	60.6	57.4	59.2
Tlaxcala	70.5	59.5	66.1
Veracruz	62.0	65.0	67.0
Yucatán	60.3	56.4	67.4
Zacatecas	61.3	63.8	70.3
Nacional	65.7	65.7	68.4

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir heroína
en la población femenina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE8

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	65.1	73.3	78.6
Baja California	77.1	78.7	78.1
Baja California Sur	69.2	74.9	81.9
Campeche	67.4	63.6	62.5
Chiapas	74.8	70.0	64.7
Chihuahua	73.8	73.0	77.7
Ciudad de México	75.8	66.8	73.4
Coahuila	71.9	70.2	69.7
Colima	69.3	72.3	76.0
Durango	71.1	74.2	75.4
Estado de México	63.6	64.1	70.3
Guanajuato	74.9	76.2	82.3
Guerrero	74.3	69.8	67.1
Hidalgo	68.3	65.1	69.1
Jalisco	66.1	70.2	72.3
Michoacán	71.3	77.7	76.1
Morelos	71.1	74.4	77.1
Nayarit	73.6	79.7	71.5
Nuevo León	69.6	58.1	69.3
Oaxaca	66.5	67.7	66.0
Puebla	64.0	63.5	63.6
Querétaro	68.8	74.6	72.5
Quintana Roo	66.4	63.8	69.5
San Luis Potosí	67.4	61.7	66.9
Sinaloa	74.6	81.5	81.5
Sonora	66.8	75.0	75.3
Tabasco	68.2	69.7	72.2
Tamaulipas	57.9	59.8	70.6
Tlaxcala	67.5	65.2	72.0
Veracruz	69.8	67.3	67.3
Yucatán	60.4	71.4	59.6
Zacatecas	71.6	78.6	72.4
Nacional	69.1	68.9	71.5

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir cocaína
en la población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE9

Estado	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	66.7	78.6	72.9
Baja California	76.0	80.8	78.4
Baja California Sur	76.0	80.2	78.0
Campeche	68.3	67.4	67.9
Chiapas	64.6	69.4	67.1
Chihuahua	73.7	77.1	75.5
Ciudad de México	66.3	74.7	70.7
Coahuila	69.0	71.7	70.4
Colima	74.6	75.4	75.0
Durango	71.1	75.4	73.3
Estado de México	67.4	67.9	67.6
Guanajuato	78.2	81.5	79.9
Guerrero	68.3	71.7	70.1
Hidalgo	61.3	68.7	65.2
Jalisco	73.1	73.8	73.5
Michoacán	68.3	78.4	73.6
Morelos	69.4	75.3	72.5
Nayarit	79.3	77.3	78.3
Nuevo León	65.5	68.1	66.8
Oaxaca	63.9	69.4	66.8
Puebla	60.8	65.2	63.2
Querétaro	68.6	74.9	71.9
Quintana Roo	69.4	68.4	68.9
San Luis Potosí	59.4	67.0	63.4
Sinaloa	78.2	81.8	80.0
Sonora	73.1	77.1	75.1
Tabasco	68.0	74.0	71.1
Tamaulipas	61.6	66.9	64.3
Tlaxcala	65.4	71.6	68.6
Veracruz	68.2	70.2	69.2
Yucatán	64.8	66.4	65.6
Zacatecas	65.0	75.8	70.7
Nacional	68.4	72.3	70.4

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir cocaína
en la población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE10

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	71.1	67.6	78.9
Baja California	71.7	77.2	82.0
Baja California Sur	69.2	78.1	81.1
Campeche	69.4	67.1	68.0
Chiapas	69.1	68.8	64.2
Chihuahua	73.0	74.9	76.9
Ciudad de México	67.5	68.8	73.0
Coahuila	68.0	67.3	74.0
Colima	70.1	72.8	78.9
Durango	66.7	72.1	77.3
Estado de México	60.2	67.3	70.6
Guanajuato	75.4	78.0	83.8
Guerrero	73.3	69.0	69.4
Hidalgo	60.3	65.4	67.0
Jalisco	74.1	71.2	75.4
Michoacán	72.3	72.7	74.9
Morelos	68.8	69.1	76.8
Nayarit	76.5	80.2	77.3
Nuevo León	64.4	62.4	71.4
Oaxaca	70.4	63.1	68.5
Puebla	62.6	62.6	63.9
Querétaro	69.8	74.0	70.8
Quintana Roo	69.6	67.2	70.7
San Luis Potosí	66.9	61.5	63.6
Sinaloa	74.7	79.4	82.5
Sonora	70.3	75.9	76.1
Tabasco	69.2	68.9	74.1
Tamaulipas	60.7	62.8	66.9
Tlaxcala	69.9	64.2	72.6
Veracruz	67.7	67.8	71.0
Yucatán	63.2	65.4	66.7
Zacatecas	64.8	69.9	74.0
Nacional	67.9	69.1	72.5

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir cocaína
en la población masculina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE11

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	70.2	58.4	73.6
Baja California	64.2	75.5	81.0
Baja California Sur	67.0	78.0	77.0
Campeche	69.3	64.5	71.7
Chiapas	67.1	65.1	62.7
Chihuahua	72.5	73.8	74.2
Ciudad de México	60.7	63.9	69.9
Coahuila	66.6	63.3	75.6
Colima	68.2	70.8	80.5
Durango	63.4	66.1	79.3
Estado de México	60.8	68.4	68.9
Guanajuato	76.0	76.9	80.6
Guerrero	73.2	64.8	69.1
Hidalgo	54.0	63.4	62.6
Jalisco	75.2	68.4	77.0
Michoacán	70.5	63.4	71.8
Morelos	64.8	65.0	75.1
Nayarit	75.7	78.6	81.4
Nuevo León	62.0	62.1	69.8
Oaxaca	72.1	54.0	68.1
Puebla	58.7	61.2	61.5
Querétaro	72.0	68.7	67.0
Quintana Roo	67.8	68.3	71.3
San Luis Potosí	62.6	57.4	59.8
Sinaloa	74.4	76.0	81.6
Sonora	69.1	73.6	74.2
Tabasco	69.6	63.4	71.9
Tamaulipas	64.1	58.8	63.3
Tlaxcala	70.0	59.8	68.9
Veracruz	61.3	67.1	72.0
Yucatán	61.6	58.5	72.0
Zacatecas	59.7	60.4	71.8
Nacional	66.2	66.4	71.2

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir cocaína
en la población femenina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE12

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	71.9	76.2	83.6
Baja California	79.6	79.0	83.0
Baja California Sur	71.6	78.2	85.3
Campeche	69.6	69.5	64.5
Chiapas	71.0	71.9	65.6
Chihuahua	73.4	76.1	79.3
Ciudad de México	74.8	73.5	75.6
Coahuila	69.5	71.5	72.6
Colima	72.0	74.7	77.3
Durango	70.0	77.6	75.6
Estado de México	59.5	66.3	72.1
Guanajuato	74.8	79.0	86.6
Guerrero	73.4	73.0	69.6
Hidalgo	66.7	67.2	70.9
Jalisco	72.9	73.8	74.1
Michoacán	74.1	81.0	77.7
Morelos	72.9	72.7	78.3
Nayarit	77.3	81.7	73.3
Nuevo León	66.8	62.7	73.0
Oaxaca	68.8	70.5	68.8
Puebla	66.4	63.9	66.0
Querétaro	67.7	78.7	74.0
Quintana Roo	71.5	66.0	70.0
San Luis Potosí	71.4	65.2	66.9
Sinaloa	75.0	82.7	83.5
Sonora	71.6	78.3	78.0
Tabasco	68.7	73.9	76.1
Tamaulipas	57.3	66.7	70.4
Tlaxcala	69.8	68.3	75.7
Veracruz	74.4	68.5	70.1
Yucatán	64.8	71.9	61.7
Zacatecas	70.2	78.0	75.9
Nacional	69.7	71.7	73.7

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir inhalables
en la población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE13

Estado	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	70.0	78.4	74.4
Baja California	76.3	80.0	78.1
Baja California Sur	78.3	79.7	79.0
Campeche	70.1	66.8	68.4
Chiapas	65.6	68.9	67.3
Chihuahua	73.4	75.4	74.4
Ciudad de México	68.3	73.5	71.0
Coahuila	67.4	70.5	68.9
Colima	73.6	75.8	74.7
Durango	71.5	76.7	74.2
Estado de México	69.9	68.6	69.2
Guanajuato	78.9	81.6	80.4
Guerrero	68.1	70.4	69.3
Hidalgo	62.0	69.1	65.7
Jalisco	73.6	74.8	74.2
Michoacán	69.8	76.6	73.4
Morelos	72.0	76.9	74.5
Nayarit	77.8	75.4	76.5
Nuevo León	63.7	68.0	65.9
Oaxaca	63.2	66.4	64.9
Puebla	59.4	65.2	62.5
Querétaro	68.9	76.0	72.6
Quintana Roo	67.5	67.4	67.5
San Luis Potosí	58.6	66.1	62.5
Sinaloa	79.9	81.1	80.5
Sonora	70.3	77.9	74.1
Tabasco	67.6	72.7	70.2
Tamaulipas	60.9	64.4	62.7
Tlaxcala	63.0	70.4	66.9
Veracruz	66.3	67.5	66.9
Yucatán	62.0	67.5	64.8
Zacatecas	67.2	77.7	72.7
Nacional	68.7	71.8	70.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir inhalables
en la población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE14

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	72.9	70.3	79.1
Baja California	67.1	77.1	83.1
Baja California Sur	66.5	79.7	82.7
Campeche	68.3	68.3	68.5
Chiapas	69.1	68.4	65.2
Chihuahua	68.8	74.3	76.6
Ciudad de México	68.4	67.4	74.5
Coahuila	63.3	66.5	73.4
Colima	68.5	72.2	79.3
Durango	67.6	72.7	78.4
Estado de México	63.2	68.9	71.8
Guanajuato	73.9	79.0	84.6
Guerrero	70.0	68.2	70.0
Hidalgo	60.9	65.0	68.3
Jalisco	71.5	72.7	76.7
Michoacán	71.2	71.7	75.8
Morelos	70.7	72.8	77.5
Nayarit	71.9	79.3	75.9
Nuevo León	65.1	60.4	70.9
Oaxaca	64.2	60.6	69.0
Puebla	58.6	62.9	63.8
Querétaro	66.8	76.4	71.4
Quintana Roo	68.4	65.3	69.7
San Luis Potosí	67.4	60.3	62.5
Sinaloa	75.1	80.8	82.4
Sonora	66.4	74.9	76.2
Tabasco	69.7	68.3	72.4
Tamaulipas	60.5	59.3	66.5
Tlaxcala	63.1	66.0	69.4
Veracruz	61.7	65.7	70.0
Yucatán	65.4	62.6	66.8
Zacatecas	64.8	73.5	75.4
Nacional	66.6	69.0	72.9

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir inhalables
en la población masculina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE15

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	76.0	62.8	74.7
Baja California	61.4	74.6	83.5
Baja California Sur	64.0	80.6	81.1
Campeche	67.4	69.3	71.9
Chiapas	63.5	68.1	64.1
Chihuahua	69.9	73.8	74.4
Ciudad de México	59.5	65.7	73.0
Coahuila	57.5	64.0	74.7
Colima	61.7	70.3	81.2
Durango	62.9	68.2	78.7
Estado de México	60.3	73.4	70.3
Guanajuato	72.9	78.2	82.6
Guerrero	72.3	63.2	70.6
Hidalgo	54.4	62.1	65.1
Jalisco	72.0	70.3	77.6
Michoacán	71.0	64.7	74.1
Morelos	68.7	68.6	76.2
Nayarit	74.0	80.1	77.1
Nuevo León	62.8	60.4	66.9
Oaxaca	69.4	52.1	69.4
Puebla	59.3	57.2	61.7
Querétaro	66.1	71.0	68.1
Quintana Roo	67.5	66.9	68.2
San Luis Potosí	65.5	56.2	57.7
Sinaloa	72.6	80.1	82.6
Sonora	61.6	70.9	72.9
Tabasco	68.4	64.3	70.5
Tamaulipas	63.3	58.7	62.1
Tlaxcala	61.2	62.8	64.1
Veracruz	62.1	63.0	70.9
Yucatán	63.6	52.2	70.6
Zacatecas	58.1	66.4	72.3
Nacional	64.8	67.1	71.7

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir inhalables
en la población femenina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE16

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	69.9	77.3	83.0
Baja California	73.2	79.7	82.7
Baja California Sur	69.1	78.8	84.4
Campeche	69.3	67.3	65.3
Chiapas	74.7	68.7	66.1
Chihuahua	67.8	74.8	78.6
Ciudad de México	78.0	69.0	75.7
Coahuila	69.5	69.0	72.2
Colima	75.6	74.1	77.5
Durango	72.4	77.0	78.1
Estado de México	66.1	64.7	73.1
Guanajuato	74.8	79.7	86.4
Guerrero	67.7	72.8	69.5
Hidalgo	67.6	67.5	71.2
Jalisco	71.0	75.0	76.0
Michoacán	71.4	78.0	77.4
Morelos	72.6	76.7	78.6
Nayarit	69.7	78.4	74.7
Nuevo León	67.5	60.4	74.6
Oaxaca	58.9	67.4	68.6
Puebla	58.0	67.9	65.5
Querétaro	67.6	81.2	74.2
Quintana Roo	69.3	63.6	71.1
San Luis Potosí	69.4	63.9	66.8
Sinaloa	77.6	81.4	82.2
Sonora	71.2	78.9	79.3
Tabasco	71.1	71.9	74.2
Tamaulipas	57.7	59.9	70.6
Tlaxcala	65.1	69.0	74.0
Veracruz	61.4	68.1	69.2
Yucatán	67.1	72.3	63.2
Zacatecas	71.9	79.5	78.1
Nacional	68.5	70.7	74.0

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol
en la población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE17

Estado	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	38.1	53.9	46.3
Baja California	42.2	49.1	45.6
Baja California Sur	43.4	50.4	46.8
Campeche	42.7	44.9	43.8
Chiapas	47.0	54.8	51.1
Chihuahua	46.8	52.7	49.8
Ciudad de México	40.5	48.5	44.7
Coahuila	43.3	47.8	45.5
Colima	39.6	47.3	43.5
Durango	44.8	54.0	49.5
Estado de México	41.7	48.8	45.4
Guanajuato	46.9	54.6	51.0
Guerrero	48.4	49.8	49.1
Hidalgo	38.0	50.7	44.6
Jalisco	42.8	42.4	42.6
Michoacán	42.2	56.8	49.8
Morelos	49.7	55.0	52.4
Nayarit	39.1	44.1	41.6
Nuevo León	35.3	40.3	37.8
Oaxaca	46.0	50.7	48.5
Puebla	37.4	45.4	41.6
Querétaro	45.0	54.3	49.9
Quintana Roo	39.2	40.8	40.0
San Luis Potosí	31.4	43.6	37.7
Sinaloa	42.6	48.4	45.5
Sonora	39.2	45.9	42.5
Tabasco	42.4	53.4	48.1
Tamaulipas	35.4	42.0	38.8
Tlaxcala	39.2	48.6	44.1
Veracruz	41.5	49.0	45.4
Yucatán	35.8	41.7	38.9
Zacatecas	41.3	53.5	47.7
Nacional	41.6	48.7	45.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol
en la población de 12 a 65 años según edad

Cuadro CNE18

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	45.2	41.1	52.0
Baja California	40.7	43.7	49.2
Baja California Sur	44.7	44.1	50.3
Campeche	41.4	42.5	46.1
Chiapas	54.8	52.3	47.8
Chihuahua	54.9	42.3	54.6
Ciudad de México	44.2	40.7	47.9
Coahuila	43.8	40.6	50.7
Colima	46.8	37.6	47.7
Durango	42.9	47.8	54.0
Estado de México	45.7	44.2	46.4
Guanajuato	49.1	49.8	52.9
Guerrero	50.8	47.4	49.9
Hidalgo	41.7	47.1	43.6
Jalisco	40.9	39.7	46.0
Michoacán	50.2	45.8	53.6
Morelos	48.7	51.3	54.8
Nayarit	41.5	42.2	41.2
Nuevo León	41.5	39.1	35.6
Oaxaca	45.7	49.1	49.2
Puebla	44.2	39.2	42.9
Querétaro	46.6	51.3	49.7
Quintana Roo	41.9	37.6	42.1
San Luis Potosí	41.7	34.7	38.8
Sinaloa	47.0	44.0	46.3
Sonora	44.5	40.0	44.1
Tabasco	48.8	46.8	49.2
Tamaulipas	40.9	36.5	40.0
Tlaxcala	48.4	42.1	44.4
Veracruz	43.5	43.2	48.0
Yucatán	44.3	33.6	41.8
Zacatecas	40.6	49.5	49.1
Nacional	45.5	43.3	47.0

Porcentajes obtenidos según edad.

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol
en la población masculina de 12 a 65 años según edad

Cuadro CNE19

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	42.6	31.5	42.8
Baja California	27.9	40.1	49.5
Baja California Sur	40.9	42.5	45.2
Campeche	39.0	40.2	46.7
Chiapas	51.6	49.8	41.5
Chihuahua	56.8	39.1	50.1
Ciudad de México	36.8	39.2	42.7
Coahuila	45.3	36.7	48.8
Colima	45.7	31.8	44.7
Durango	37.0	40.7	52.3
Estado de México	39.5	40.6	43.7
Guanajuato	50.6	45.2	46.8
Guerrero	51.9	45.2	49.6
Hidalgo	36.1	39.4	37.6
Jalisco	43.3	41.9	43.4
Michoacán	45.5	33.7	48.7
Morelos	45.7	50.2	50.8
Nayarit	41.0	39.1	38.4
Nuevo León	37.0	37.4	32.9
Oaxaca	44.9	45.6	46.8
Puebla	46.4	33.5	36.9
Querétaro	49.2	42.7	45.4
Quintana Roo	45.9	37.2	38.9
San Luis Potosí	39.2	29.0	29.9
Sinaloa	44.9	41.1	43.1
Sonora	38.9	38.2	40.2
Tabasco	43.1	39.6	45.1
Tamaulipas	42.5	37.0	31.3
Tlaxcala	47.9	35.8	38.7
Veracruz	37.2	40.7	43.9
Yucatán	36.6	28.0	43.0
Zacatecas	39.5	40.8	42.7
Nacional	42.7	39.8	43.0

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol
en la población femenina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE20

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	47.8	50.1	60.0
Baja California	54.1	47.3	49.0
Baja California Sur	48.8	45.8	55.6
Campeche	43.8	44.6	45.5
Chiapas	58.1	54.4	53.7
Chihuahua	53.0	45.5	58.8
Ciudad de México	52.3	42.1	52.3
Coahuila	42.3	44.6	52.5
Colima	48.0	43.5	50.6
Durango	48.8	54.5	55.5
Estado de México	52.0	47.7	48.7
Guanajuato	47.6	53.9	58.3
Guerrero	49.8	49.4	50.2
Hidalgo	47.5	53.8	49.0
Jalisco	38.4	37.5	48.4
Michoacán	54.9	56.5	57.9
Morelos	51.7	52.4	58.3
Nayarit	42.0	45.2	43.9
Nuevo León	46.2	40.8	38.0
Oaxaca	46.5	51.8	51.4
Puebla	42.1	44.1	48.0
Querétaro	44.1	59.2	53.6
Quintana Roo	37.6	37.9	45.5
San Luis Potosí	44.3	39.7	46.8
Sinaloa	49.2	46.9	49.4
Sonora	50.3	41.8	47.9
Tabasco	54.6	53.4	52.9
Tamaulipas	39.4	36.0	48.3
Tlaxcala	48.9	47.7	49.4
Veracruz	50.1	45.4	51.6
Yucatán	51.9	38.9	40.7
Zacatecas	41.8	56.9	54.8
Nacional	48.5	46.7	50.6

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de drogas
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CNE21

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	99.5	99.0	99.3
Baja California	96.7	99.2	97.9
Baja California Sur	100.0	100.0	100.0
Campeche	100.0	99.4	99.7
Chiapas	98.7	100.0	99.3
Chihuahua	99.8	99.7	99.8
Ciudad de México	100.0	98.6	99.3
Coahuila	99.7	99.5	99.6
Colima	98.7	99.4	99.0
Durango	100.0	99.5	99.7
Estado de México	99.7	99.3	99.5
Guanajuato	99.3	99.3	99.3
Guerrero	100.0	99.6	99.8
Hidalgo	97.0	99.7	98.3
Jalisco	99.4	100.0	99.7
Michoacán	98.4	100.0	99.2
Morelos	99.5	99.3	99.4
Nayarit	99.5	97.3	98.4
Nuevo León	97.6	98.5	98.1
Oaxaca	99.1	100.0	99.5
Puebla	100.0	99.5	99.7
Querétaro	98.7	99.3	99.0
Quintana Roo	97.3	98.1	97.7
San Luis Potosí	99.7	100.0	99.9
Sinaloa	99.4	100.0	99.7
Sonora	99.5	99.0	99.2
Tabasco	99.2	97.7	98.5
Tamaulipas	99.6	99.2	99.4
Tlaxcala	100.0	100.0	100.0
Veracruz	99.3	99.2	99.3
Yucatán	99.1	98.2	98.6
Zacatecas	98.9	99.6	99.3
Nacional	99.2	99.4	99.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de drogas
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CNE22

Estado	Lo vería mal		
	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	87.2	89.2	88.2
Baja California	86.3	92.8	89.5
Baja California Sur	90.2	92.7	91.5
Campeche	87.3	88.0	87.6
Chiapas	92.3	95.5	93.9
Chihuahua	92.5	92.6	92.5
Ciudad de México	83.9	87.3	85.6
Coahuila	84.4	84.0	84.2
Colima	90.6	90.0	90.3
Durango	85.8	85.0	85.4
Estado de México	87.1	84.8	86.0
Guanajuato	82.4	88.7	85.5
Guerrero	89.9	95.5	92.7
Hidalgo	88.8	90.7	89.7
Jalisco	88.1	95.2	91.6
Michoacán	83.4	87.6	85.5
Morelos	92.6	92.2	92.4
Nayarit	91.4	90.5	91.0
Nuevo León	87.7	87.4	87.5
Oaxaca	89.7	91.0	90.4
Puebla	92.7	89.9	91.2
Querétaro	86.7	90.9	88.8
Quintana Roo	83.3	93.8	88.4
San Luis Potosí	88.1	91.3	89.6
Sinaloa	91.3	90.9	91.1
Sonora	87.5	91.2	89.3
Tabasco	86.5	90.2	88.3
Tamaulipas	89.2	88.8	89.0
Tlaxcala	86.8	87.6	87.2
Veracruz	88.5	89.5	88.9
Yucatán	88.9	91.2	90.0
Zacatecas	84.7	87.5	86.1
Nacional	87.8	89.7	88.8

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de drogas
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE23

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	98.1	99.6	98.9
Baja California	97.6	98.3	98.0
Baja California Sur	98.3	98.7	98.5
Campeche	98.2	99.4	98.8
Chiapas	99.8	99.8	99.8
Chihuahua	97.2	99.6	98.4
Ciudad de México	97.5	98.5	98.0
Coahuila	97.9	97.2	97.6
Colima	99.0	99.1	99.0
Durango	98.9	99.8	99.4
Estado de México	97.8	99.2	98.5
Guanajuato	99.7	99.7	99.7
Guerrero	99.1	99.7	99.4
Hidalgo	100.0	99.6	99.8
Jalisco	96.1	99.8	98.1
Michoacán	98.4	99.5	99.0
Morelos	98.2	99.6	98.9
Nayarit	99.6	99.9	99.8
Nuevo León	97.4	96.7	97.0
Oaxaca	98.9	99.8	99.4
Puebla	98.6	99.1	98.9
Querétaro	97.7	99.2	98.5
Quintana Roo	96.1	99.2	97.6
San Luis Potosí	98.3	99.4	98.9
Sinaloa	98.6	100.0	99.3
Sonora	98.0	99.3	98.7
Tabasco	98.7	100.0	99.4
Tamaulipas	96.2	97.9	97.1
Tlaxcala	98.8	99.4	99.1
Veracruz	99.4	99.6	99.5
Yucatán	99.1	95.0	96.9
Zacatecas	98.5	100.0	99.3
Nacional	98.2	99.1	98.6

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de drogas
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE24

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	87.3	95.1	91.4
Baja California	84.3	92.7	88.5
Baja California Sur	88.1	93.7	90.8
Campeche	88.9	96.7	93.0
Chiapas	92.3	95.4	93.9
Chihuahua	84.0	96.2	90.1
Ciudad de México	85.4	94.8	90.4
Coahuila	84.8	92.0	88.4
Colima	90.7	95.5	93.1
Durango	89.0	94.1	91.7
Estado de México	86.2	94.7	90.6
Guanajuato	86.6	94.2	90.6
Guerrero	87.9	97.3	92.9
Hidalgo	87.5	96.8	92.4
Jalisco	90.4	93.4	92.0
Michoacán	88.2	94.8	91.7
Morelos	93.0	96.8	95.0
Nayarit	91.5	96.6	94.0
Nuevo León	89.6	91.8	90.7
Oaxaca	90.2	95.7	93.2
Puebla	86.2	95.8	91.3
Querétaro	87.0	95.4	91.4
Quintana Roo	85.6	93.8	89.6
San Luis Potosí	86.5	96.4	91.7
Sinaloa	91.7	98.1	95.0
Sonora	87.2	91.5	89.4
Tabasco	88.8	95.5	92.3
Tamaulipas	87.1	93.9	90.6
Tlaxcala	87.1	94.8	91.2
Veracruz	87.3	95.4	91.6
Yucatán	89.3	91.4	90.4
Zacatecas	83.6	95.3	89.8
Nacional	87.6	94.7	91.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de alcohol
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CNE25

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	88.7	91.7	90.2
Baja California	93.9	98.3	96.1
Baja California Sur	97.2	93.4	95.4
Campeche	95.6	96.3	95.9
Chiapas	97.4	98.8	98.1
Chihuahua	95.2	94.7	94.9
Ciudad de México	94.4	92.9	93.7
Coahuila	96.2	95.4	95.8
Colima	91.1	95.5	93.2
Durango	98.3	98.8	98.5
Estado de México	95.3	93.4	94.3
Guanajuato	93.2	98.3	95.8
Guerrero	98.9	99.4	99.1
Hidalgo	91.6	98.4	95.0
Jalisco	93.9	93.4	93.7
Michoacán	92.5	97.8	95.1
Morelos	93.9	98.2	96.1
Nayarit	95.7	93.4	94.5
Nuevo León	92.7	97.3	95.0
Oaxaca	95.2	97.9	96.6
Puebla	97.9	96.2	97.0
Querétaro	97.4	96.4	96.9
Quintana Roo	95.1	97.3	96.2
San Luis Potosí	95.5	95.0	95.3
Sinaloa	97.0	97.2	97.1
Sonora	94.6	97.8	96.2
Tabasco	98.2	98.3	98.2
Tamaulipas	98.2	95.5	96.8
Tlaxcala	95.5	93.2	94.4
Veracruz	94.2	97.7	95.9
Yucatán	98.4	89.1	93.8
Zacatecas	97.0	95.1	96.1
Nacional	95.2	96.0	95.6

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de alcohol
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CNE26

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	67.0	69.7	68.3
Baja California	62.3	79.3	70.6
Baja California Sur	80.1	81.2	80.7
Campeche	76.3	75.5	75.9
Chiapas	81.6	83.1	82.3
Chihuahua	75.0	82.8	78.9
Ciudad de México	71.2	69.7	70.5
Coahuila	66.9	73.1	70.0
Colima	68.8	70.0	69.4
Durango	70.6	69.5	70.1
Estado de México	73.8	64.4	69.2
Guanajuato	63.3	76.8	70.0
Guerrero	77.2	80.8	79.0
Hidalgo	65.0	77.4	71.1
Jalisco	65.3	70.6	67.9
Michoacán	64.0	74.4	69.2
Morelos	75.4	75.7	75.5
Nayarit	73.2	79.0	76.1
Nuevo León	68.0	71.3	69.6
Oaxaca	77.3	76.0	76.7
Puebla	75.8	72.5	74.1
Querétaro	74.9	74.1	74.5
Quintana Roo	70.3	80.7	75.4
San Luis Potosí	69.8	75.1	72.5
Sinaloa	76.8	83.6	80.2
Sonora	70.8	74.5	72.6
Tabasco	75.4	77.9	76.6
Tamaulipas	74.3	79.0	76.7
Tlaxcala	75.4	75.8	75.6
Veracruz	70.5	71.6	71.0
Yucatán	74.6	75.4	75.0
Zacatecas	63.3	67.6	65.4
Nacional	71.5	73.8	72.6

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de alcohol
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE27

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	79.7	89.0	84.6
Baja California	82.5	84.8	83.6
Baja California Sur	80.2	90.5	85.2
Campeche	91.9	92.9	92.4
Chiapas	95.0	96.7	95.9
Chihuahua	84.5	89.4	87.0
Ciudad de México	82.9	86.0	84.5
Coahuila	83.5	86.2	84.9
Colima	79.6	84.8	82.2
Durango	91.0	93.1	92.1
Estado de México	85.0	89.3	87.2
Guanajuato	89.3	94.8	92.2
Guerrero	89.5	96.1	93.0
Hidalgo	88.3	91.8	90.2
Jalisco	74.8	79.3	77.2
Michoacán	83.6	94.2	89.2
Morelos	86.2	94.3	90.5
Nayarit	86.8	92.1	89.5
Nuevo León	74.6	79.5	77.1
Oaxaca	93.9	96.1	95.1
Puebla	87.8	88.4	88.1
Querétaro	83.9	91.9	88.1
Quintana Roo	81.6	89.0	85.3
San Luis Potosí	85.5	92.1	89.0
Sinaloa	84.8	91.5	88.2
Sonora	82.7	89.0	85.8
Tabasco	92.0	96.0	94.1
Tamaulipas	79.9	88.0	84.1
Tlaxcala	86.2	91.8	89.2
Veracruz	90.6	93.2	92.0
Yucatán	85.8	84.2	85.0
Zacatecas	89.7	95.1	92.6
Nacional	85.0	89.6	87.4

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de alcohol
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE28

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	49.6	70.7	60.6
Baja California	51.8	67.5	59.6
Baja California Sur	57.2	71.1	63.9
Campeche	59.4	81.2	70.6
Chiapas	73.2	85.4	79.6
Chihuahua	57.5	71.8	64.7
Ciudad de México	56.2	72.8	65.0
Coahuila	52.8	68.6	60.8
Colima	54.5	71.2	62.9
Durango	62.6	75.4	69.3
Estado de México	59.0	77.0	68.4
Guanajuato	57.6	81.2	70.1
Guerrero	66.9	82.5	75.1
Hidalgo	62.4	74.7	68.9
Jalisco	52.8	69.4	61.4
Michoacán	58.3	77.6	68.5
Morelos	66.5	80.6	73.9
Nayarit	57.1	75.9	66.6
Nuevo León	42.9	57.1	50.1
Oaxaca	71.8	80.5	76.5
Puebla	62.0	75.5	69.2
Querétaro	56.2	77.4	67.3
Quintana Roo	57.6	71.5	64.4
San Luis Potosí	54.2	76.8	66.0
Sinaloa	61.3	78.7	70.1
Sonora	57.8	69.6	63.7
Tabasco	65.4	83.0	74.6
Tamaulipas	54.1	72.4	63.5
Tlaxcala	53.7	73.5	64.2
Veracruz	60.6	79.1	70.3
Yucatán	61.6	69.9	65.9
Zacatecas	55.4	78.4	67.6
Nacional	58.3	75.0	67.0

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



**ANEXO 13: INTERVALOS
DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN
DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Listado de Tablas

Percepción del riesgo de consumir marihuana en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Percepción del riesgo de consumir heroína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años según sexo

Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 18 a 65 años según sexo

Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo

Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Percepción del riesgo de consumir marihuana en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN1

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	45.3	43.311-47.277
18-34	27.6	25.561-29.578
35-65	33.0	31.315-34.610
Subtotal Hombres	33.0	31.834-34.127
Mujeres		
12-17	52.3	50.184-54.484
18-34	37.2	35.552-38.834
35-65	42.9	41.538-44.215
Subtotal Mujeres	42.1	41.087-43.173
Total 12-17	48.8	47.294-50.256
Total 18-34	32.5	31.271-33.818
Total 35-65	38.2	37.060-39.299
Total	37.7	36.898-38.526

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Percepción del riesgo de consumir heroína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN2

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	65.7	63.861-67.566
18-34	65.7	63.743-67.695
35-65	68.4	66.815-69.915
Subtotal Hombres	66.8	65.710-67.973
Mujeres		
12-17	69.1	67.117-71.043
18-34	68.9	67.250-70.585
35-65	71.5	70.189-72.733
Subtotal Mujeres	70.1	69.063-71.065
Total 12-17	67.4	66.039-68.717
Total 18-34	67.4	66.054-68.691
Total 35-65	70.0	68.955-71.033
Total	68.5	67.703-69.313

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN3

Sexo/Edad	%	Es muy peligroso IC 95%
Hombres		
12-17	66.2	64.271-68.058
18-34	66.4	64.368-68.348
35-65	71.2	69.694-72.691
Subtotal Hombres	68.4	67.229-69.525
Mujeres		
12-17	69.7	67.798-71.642
18-34	71.7	70.151-73.323
35-65	73.7	72.492-74.952
Subtotal Mujeres	72.3	71.341-73.233
Total 12-17	67.9	66.540-69.305
Total 18-34	69.1	67.838-70.439
Total 35-65	72.5	71.500-73.546
Total	70.4	69.598-71.200

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN4

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	64.8	62.787-66.745
18-34	67.1	65.124-69.140
35-65	71.7	70.199-73.218
Subtotal Hombres	68.7	67.512-69.806
Mujeres		
12-17	68.5	66.547-70.433
18-34	70.7	68.963-72.493
35-65	74.0	72.805-75.204
Subtotal Mujeres	71.8	70.845-72.777
Total 12-17	66.6	65.152-68.062
Total 18-34	69.0	67.637-70.345
Total 35-65	72.9	71.914-73.919
Total	70.3	69.495-71.083

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN5

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	42.7	40.701-44.627
18-34	39.8	37.759-41.760
35-65	43.0	41.289-44.649
Subtotal Hombres	41.6	40.434-42.834
Mujeres		
12-17	48.5	46.403-50.550
18-34	46.7	44.969-48.390
35-65	50.6	49.188-51.915
Subtotal Mujeres	48.7	47.630-49.717
Total 12-17	45.5	44.078-46.997
Total 18-34	43.3	42.015-44.658
Total 35-65	47.0	45.882-48.036
Total	45.3	44.435-46.113

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años según sexo

Cuadro ICCN6

Sexo/Edad	Lo vería mal tu familia		Lo vería mal tu mejor amigo/a	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	99.2	98.980-99.498	87.8	86.502-89.108
Mujeres	99.4	99.081-99.632	89.7	88.377-91.054
Total	99.3	99.109-99.486	88.8	87.816-89.688

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 18 a 65 años según sexo

Cuadro ICCN7

Sexo/Edad	Lo vería mal tu familia		Lo vería mal tu mejor amigo/a	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	98.2	97.741-98.572	87.6	86.629-88.477
Mujeres	99.1	98.849-99.338	94.7	94.224-95.225
Total	98.6	98.410-98.881	91.3	90.773-91.797

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo

Cuadro ICCN8

Sexo/Edad	Lo vería mal tu familia		Lo vería mal tu mejor amigo/a	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	95.2	94.346-96.076	71.5	69.628-73.304
Mujeres	96.0	95.017-96.973	73.8	71.822-75.800
Total	95.6	94.954-96.245	72.6	71.284-73.969

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

Cuadro ICCN9

Sexo/Edad	Lo vería mal tu familia		Lo vería mal tu mejor amigo/a	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	85.0	83.882-86.147	58.3	56.883-59.774
Mujeres	89.6	88.665-90.449	75.0	74.029-76.014
Total	87.4	86.604-88.169	67.0	66.081-67.939

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 6: MAPAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL



Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 -2017


Resultados Nacionales Población Total Alguna Vez



Incidencia Acumulada del Consumo de Cualquier Droga

Total Nacional = 10.3%

IC 95% 9.788-10.813



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Cualquier Droga Ilegal

Total Nacional = 9.9%

IC 95% 9.372-10.391



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Cualquier Droga Médica

Total Nacional = 1.3%

IC 95% 1.119-1.455



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Opiáceos

Total Nacional = 0.1%
IC 95% 0.067-0.180



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Tranquilizantes

Total Nacional = 0.9%
IC 95% 0.759-1.026



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Sedantes

Total Nacional = 0.1%
IC 95% 0.060-0.137



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.


Incidencia Acumulada del Consumo de Anfetaminas

Total Nacional = 0.4%
IC 95% 0.255-0.456




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Marihuana




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Cocaína




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Crack



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Alucinógenos



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Inhalables

Total Nacional = 1.1%
IC 95% 0.942-1.287



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Heroína


Total Nacional = 0.2%
IC 95% 0.097-0.244



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Metanfetaminas

Total Nacional = 0.9%
IC 95% 0.731-1.013



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Marihuana Sintética

Total Nacional = 0.3%
IC 95% 0.190-0.343



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Resultados Nacionales Población Total Último Año

Consumo de Cualquier Droga en el Último Año

Total Nacional = 2.9%
IC 95% 2.670-3.216



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Cualquier Droga Ilegal en el Último Año

Total Nacional = 2.7%
IC 95% 2.417-2.947



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Cualquier Droga Médica en el Último Año

Total Nacional = 0.5%
IC 95% 0.370-0.596



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Opiáceos en el Último Año

Total Nacional = ***
IC 95% 0.010-0.049



***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Tranquilizantes en el Último Año

Total Nacional = 0.3%
IC 95% 0.224-0.377



- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Sedantes en el Último Año

Total Nacional = ***
IC 95% 0.014-0.071



***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Anfetaminas en el Último Año

Total Nacional = 0.2%
IC 95% 0.097-0.272



- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Marihuana en el Último Año



Total Nacional = 2.1%
IC 95% 1.911-2.362

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Cocaína en el Último Año



Total Nacional = 0.8%
IC 95% 0.632-0.971

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Crack en el Último Año



Total Nacional = 0.2%
IC 95% 0.112-0.240

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Alucinógenos en el Último Año




Total Nacional = 0.2%
IC 95% 0.086-0.233

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Inhalables en el Último Año




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Heroína en el Último Año



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Metanfetaminas en el Último Año



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

**Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
2016-2017: Reporte de Drogas.** Se terminó de imprimir en
septiembre del 2017 en Editores Buena Onda S.A. de C.V. Suiza
Nº 14 Col. Portales Oriente C.P. 03570, Delegación Benito
Juárez, México D.F. con un tiraje de 2000 ejemplares.